

فهرست پادزهرهای آفت‌کش‌های مجاز کشاورزی کشور

مهر ۱۴۰۳

فهرست پادزهرهای آفت‌کش‌های مجاز کشاورزی کشور بر اساس ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ نباتات به منظور ارسال به مدیریت های حفظ نباتات استان‌ها برای تأمین پادزهرهای لازم توسط مراکز درمانی و پزشکی تهیه و تدوین شده است. این فهرست از طریق وب گاه این سازمان به نشانی www.ppo.ir نیز قابل دسترسی است. انتظار دارد موارد و نقطه نظرات کارشناسی با هدف اصلاح و روزآمد کردن سالیانه این فهرست، به دبیرخانه هیأت نظارت بر سموم ارسال شود تا در به روزرسانی‌های بعدی مد نظر قرار گیرد.

در این فهرست پادزهرها بر اساس گروه‌بندی آفت‌کش‌های تصویب شده کشور درج شده است. همچنین پادزهرهای توصیه شده در مورد آفت‌کش‌های پرخطر و علایم مسمومیت و کمک‌های اولیه برای آفت‌کش‌های جدید که پادزهر ندارند، آمده است. سمومی که پادزهر تخصصی ندارند بر اساس علایم و نشانه‌های بالینی درمان می‌شوند. کلیه پادزهرها باید در حضور پزشک و یا در مرکز درمانی با روش توصیه شده در منابع پزشکی استفاده شوند. در زمان انتقال فرد مسموم به مرکز درمانی ارائه برچسب به پزشک و مسئولان درمانی مرکز ضروری است.

اطلاعات این فهرست از کتاب فهرست سموم مجاز کشاورزی کشور، وب‌گاه سازمان بهداشت جهانی، سازمان خوارو بار کشاورزی ملل متحد و برگه اطلاعات ایمنی آفت‌کش‌ها استخراج و مطابق نظرات انجمن سم شناسی و مسمومیت های ایران به روزرسانی و در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ هیأت نظارت بر سموم تأیید شده است.

مطابق مواد ۲۹ و ۵۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ نباتات کشور، شرکت‌ها و فروشگاه‌های مجاز سموم موظفند نشریه کامل و صحیحی برای سموم خطرناک با ذکر پادزهر آن‌ها تهیه و در موقع فروش به خریداران تسلیم و رسید دریافت کنند. صحت مفاد نشریه باید به تأیید سازمان حفظ نباتات رسیده و دارای نکات مشروح زیر باشد:

موارد و روش کاربرد سم، مواد ممنوعه استعمال سم، آفات و بیماری‌هایی که به وسیله این سم مبارزه می‌شوند، احتیاط‌های لازم و معالجه مسمومان و پادزهر سم.

شرکت‌ها و مؤسسه‌های دفع آفات باید همیشه بر حسب نوع سمی که مصرف می‌کنند پادزهر لازم را ذخیره داشته باشند تا در موارد ضروری در اختیار پزشک معالج قرار دهند.

فروشنده‌گان موظفند به هر مصرف کننده سموم، ورقه‌هایی شامل اطلاعات طرز مصرف، احتیاط‌های لازم و مشخصات پادزهر را که قبلن به تصویب مقامات صلاحیت دار رسیده باشد تسلیم و دفتر رسیدی برای فروش سموم در محل فروش داشته باشند که اسم سم خریداری شده را در دفتر مزبور ثبت کنند و در مقابل آن از خریدار امضا و رسید دریافت کنند.

هیأت نظارت بر سموم

پادزهر حشره‌کش‌ها، کنه‌کش‌ها و نماتدکش‌های تصویب شده در کشور بر اساس کلاس شیمیایی

سمومی که پادزهر تخصصی ندارند در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی درمان می‌شوند.

پادزهر	خانواده	حشره‌کش‌ها، کنه‌کش‌ها و نماتدکش‌ها
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>avermectines</i>	آبامکتین آمامکتین بنزوات
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>benzoyl urea</i>	کلروفلوآزورون تفلوبنزورون دیفلوبنزورون فلوفنو کسورون هگزافلومورون
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>beta-ketonitrile</i>	سایفلومتوفن
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>butenolide</i>	فلوپیرادیفوران
آتروپین	<i>carbamates</i>	متیوکارب پیریمیکارب
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>chitin biosynthesis inhibition</i>	بوپروفزین
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>diacyl hydrazine</i>	کروموفنوزاید تبوفنوزاید
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>ddiamide</i>	فلوبن دیامید
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>diphenyl</i>	تترادیفون
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>juvenile hormone mimic</i>	فنوکسی کارب پیری پروکسی فن
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>meti acaricide</i>	فنازاکوئین

حشره کش ها، کنه کش ها و نماتد کش ها	خانواده	پادزهر
هگزی تیاژوکس دیفلوویدازین کلوفنتزین اتوکسازول	<i>mite growth inhibitor</i>	فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.
سیرومازین	<i>moulting disruptor, dipteran</i>	فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.
استامی پرید ایمیداکلوپرید تیامتوکسام تیاکلورید دینوتفوران	<i>neonicotinoid</i>	فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.
کارتاپ هیدروکلراید تیوسیکلام هیدروژن اکسالات	<i>nereistoxin analogue</i>	دیمرکاپرول
کلرپیرفوس کلرپیرفوس متیل ایتون دیازینون مالاتیون پرو فنفسوس کادوزفوس دیکلرووس دیمتوات فنامیفوس هپتنتفوس اکسی دیمتون متیل فوزالن تری کلروفون ایمیسیافوس	<i>organophosphates</i>	آتروپین و اکسیم ها مانند پیرالدوکسیم و ابیدوکسیم (Obidoxime) با نام تجاری توکسوگونین (Toxogonin®)
ایندوکساکارب	<i>oxadiazine</i>	فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.
تیودیکارب	<i>oxime carbamate</i>	آتروپین
فن پیروکسی میت	<i>phenoxy pyrazol</i>	فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.

پادزهر	خانواده	حشره‌کش‌ها، کنه‌کش‌ها و نماتدکش‌ها
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>phenylpyrazole</i>	فیپرونیل
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود. در مسمومیت‌های شدید منجر به تشنج و ترمور، استفاده از دیازپام توصیه شده است.	<i>pyrethrin & pyrethroid</i>	سایپر مترین آلفاسایپر مترین لامبدا سای هالوترین پر مترین دلتامترین فن والریت فن پروپاترین پیرترین
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>pyridazinon</i>	پیریدابن
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>quinone</i>	اس کوئینوسیل
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>selective feeding blocker</i>	بی متروزین فلونیکامید
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>spinosyn</i>	اسپینوساد
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>sulfite</i>	پروپارژیت
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>tetramic acid</i>	اسپیروتترامات
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>tetronic acie</i>	اسپیرومسیفن اسپیرودیكلوفن
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>unknown</i>	بی فنازیت پیریدالیل آزادیراختین بروموپروپیلالت بنزوکسی میت

قارچ کش تصویب شده در کشور بر اساس کلاس شیمیایی

سمومی که پادزهر تخصصی ندارند در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی درمان می شوند.

قارچ کش ها	خانواده	پادزهر
متالاکسیل	<i>acylalanine</i>	فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.
فلوپیکیلید	<i>benzamide</i>	فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.
کاربندازیم تیابندازول	<i>benzimidazole</i>	فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.
پروپاموکارب هیدروکلراید	<i>carbamate</i>	فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.
دی متومورف	<i>acinamic acid amide</i>	فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.
کلروتالونیل	<i>chloronitrile</i>	فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.
سیموکسانیل	<i>cynoacetamide oxime</i>	فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.
فناماکریل	<i>cynoacerylate</i>	فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.
سیازوفامید	<i>cynoimidazole</i>	فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.
کارپروپامید	<i>cyclopropane carboxamide</i>	فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.
ایپرودیون	<i>dicarboximide</i>	فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.

فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>dimethyl dithiocarbamate</i>	تیرام
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود. آلودگی زدایی گوارشی در مسمومیت خوراکی با محلول سولفات سدیم	<i>dinitrophenyl crotonate</i>	دینوکاپ
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>dithiolane</i>	ایزوپروتیولان
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>guanidine</i>	ایمنوکتادین تریس دودین
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>heteroaromatic</i>	های مکسازول
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>imidazole</i>	ایمازالیل پروکلراز تری فلومیزول
دیمرکاپرول	<i>inorganic</i>	بردو کوپراکسی کلراید اکسید مس سولفور
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>mandelamide</i>	مندی پروپامید
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>morpholine</i>	تری دمورف
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>oxathiincarboxamide</i>	کاربوکسین
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>oxazolidinedione</i>	فاموکسادون
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>oximinoacetate</i>	کرزوکسیم متیل تریفلوکسی استروبین

فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>phenylacetamide</i>	سایفلوفنامید
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>phenyl pyrrole</i>	فلودیوکسانیل
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>phenylurea</i>	پنسیکرون
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>phosphonate</i>	فوزتیل آلومینیوم فسفونیک اسید
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>phthalimide</i>	کاپتان
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>piperazine</i>	تریفورین
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>pyrazolecarboxamide</i>	فلوکساپیروکساد
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>pyraidine carboxamide</i>	بوسکالید
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>pyridinylethylbenzamide</i>	فلوپیرام
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>spiroketalamine</i>	اسپیروکسامین
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>strobilurin, methoxyacrylate</i>	آزوکسی استروبین پیراکلواستروبین
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>thiophanate</i>	تیوفانات متیل
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>triazole</i>	تری تیکونازول تریادیمنول تتراکونازول

فهرست پادزهرهای آفت‌کش‌های مجاز کشاورزی کشور

		تیوکونازول پروتیوکونازول پروپیکونازول سایپروکونازول دیفنکونازول بیترتانول فلوزیلازول پروپیکونازول اپوکسی کونازول هگزاکونازول فلوتریافول پنکونازول مایکلوبوتانیل
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>triazolobenzothiazole</i>	تری سیکلازول
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>triazolo, pyrimidine</i>	آمتوک ترادین

علف‌کش‌های تصویب شده در کشور بر اساس کلاس شیمیایی

سمومی که پادزهر تخصصی ندارند در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی درمان می‌شوند.

پادزهر	خانواده	علف‌کش‌ها
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>1,3,5 triazine</i>	آمترین آترازین پرومترین تربوتیلازین تربوترین
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>anilide</i>	پروپانیل
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>alkylazines</i>	ایندازیفلام
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>arylamino propionic acid</i>	دیکلوفوپ متیل فلم پروپ ام ایزو پروپیل

فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>aryloxy phenoxy propionate</i>	پینوکسادن فنوکسا پروپ پی اتیل فلوآزیفوپ پی بوتیل هالوکسی فوپ آر متیل پروپاکوئیزافوپ کوئیزالوفوپ پی اتیل کوئیزالوفوپ پی تفوریل
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>benzamide</i>	پروپیزامید
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>benzenedicarboxylic acid</i>	کلرتال دیمتیل
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>benzofuran</i>	اتوفومازیت
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>benzoic acid</i>	دای کامبا
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>benzothiadiazinone</i>	بنتازون
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>bipyridylum</i>	پاراکوات دیکلراید
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>chloroacetanilide</i>	متازاکلر
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>chloroacetamide</i>	استوکلر بوتاکلر اس متولاکلر پرتیلاکلر
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>cyclohexane dione oxime</i>	کلتودیم سیکلوکسیدیم ستوکسیدیم
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>diphenylether</i>	اکسی فلورفن

فهرست پادزهرهای آفت‌کش‌های مجاز کشاورزی کشور

فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>dinitroaniline</i>	دی نیترا مین اتال فلورالین تری فلورالین پندی متالین
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>glycine derivative</i>	گلایفوزیت
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>hydroxy benzonitrile</i>	بروموکسینیل ایوکسینیل
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>imidazolinone</i>	ایمازاتاپیر
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>inhibition of 4-HPPD</i>	تاپ رمزون
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>isoxazole</i>	ایزوکسافلوتول
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>isoxazolidinone</i>	کلومازون
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>oxadiazole</i>	اگزادیارژیل اگزادیازون
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>phenoxy carboxylic acid</i>	مکوپروپ دیکلوپروپ ام ث پ آ توفوردی
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>phenyl carbamate</i>	دس مدیفام فن مدیفام
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>phenyl pyrazoline</i>	پیریدیت کلودینوفوپ پروپارژیل
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>phosphonic acid</i>	گلو فوسینیت آمونیوم
آتروپین و اکسیم‌ها	<i>phosphoro dithioates</i>	آنیلوفوس

فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>pyrida zinone</i>	کلریدازون
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>pyridinecarboxylic acid</i>	کلوپیرالید پیکلورام فلوروکسی پیر
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>pyridinecarboxamide</i>	دیفلوفنیکان
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>pyrimidinyloxybenzoic</i>	بیس پیریپاک سدیم پیری بنزوکسیم
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>quinoline carboxylic acid</i>	کوئین مراک
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>solfonanilide</i>	تریافامون
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>sulfonylaminocarbonyl-methyl</i>	تین کاربازون متیل
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>sulfonylurea</i>	تری فلوسولفورون متیل تری بنورون متیل تریا سولفورون ریم سولفورون نیکوسولفورون تری فلوکسی سولفورون سدیم اتوکسی سولفورون بن سولفورون متیل سینوسولفورون مزوسولفورون متیل یدوسولفورون متیل سدیم فورام سولفورون مت سولفورون متیل سولفوسولفورون فلوستوسولفورون
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>thiocarbamate</i>	سیکلوات ای پی تی سی

فهرست پادزهرهای آفت‌کش‌های مجاز کشاورزی کشور

		مولینیت تیوبنکارب
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علایم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>triazinone</i>	هگزازینون متامیترون متری بوزین
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علایم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>triketone</i>	مزوتریون
فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علایم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود.	<i>triazolopyrimidine</i>	پنوکسولام
سم زدایی با بی‌کربنات سدیم، دکستروز	<i>urea</i>	تبوتیورون لینورون فلومتورون دیورون ایزوپروتورون

علائم مسمومیت و کمک‌های اولیه برای برخی از آفت‌کش‌های جدید که با توجه به سمیت کم پادزهر ندارند

نام عمومی	نام تجاری	علائم مسمومیت	کمک‌های اولیه
فوزنیل آلومینیوم + فلوبیکولید	پروفایلر	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع	در صورت تماس با پوست با محلول پلی اتیلن گلیکول ۴۰۰ شستشو داده شوند. در غیراین صورت با مقادیر آب کافی شستشو داده شود. لباس‌ها را از تن خارج نمایند. در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید. در صورت خورده شدن، شخص مسموم را وادار به استفراغ ننمایید. اگر مقدار زیادی خورده شده باشد، ذغال طبی و سولفات سدیم تجویز می‌شود و نیازی به شستشوی معده نیست. بیمار را در حالت استراحت قرار دهید، کمک‌های اولیه و سم زدایی توسط پزشک انجام شود.
اسپیرودیکلوفن	انویدور	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع	در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید. در صورت خورده شدن، کمک‌های اولیه شامل شستشوی معده با مقدار آب زیاد است.
پنسیکرون	مونسون	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع	در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید. چنانکه در اثر اشتباه در مصرف مسمومیتی رخ دهد، قبل از رسیدن پزشک مسموم را از محل آلوده دور کنید. لباس‌های آلوده فوراً تعویض شود و محل آلوده به آفت‌کش با صابون و آب کافی شستشو داده شود. برچسب آفت‌کش را قبل از هر اقدامی به پزشک نشان دهید.
تری‌فلوکسی- استرویین + تبوکونازول	ناتیوو	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع	در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید.

فهرست پادزهرهای آفت‌کش‌های مجاز کشاورزی کشور

نام عمومی	نام تجاری	علائم مسمومیت	کمک‌های اولیه
ایندازیفلام	الیون	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع	در صورت تماس با پوست با محلول پلی اتیلن گلیکول ۴۰۰ شستشو داده شوند. در غیر این صورت با مقادیر آب کافی شستشو داده شود. در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید. اگر در اثر سهل‌انگاری مسمومیتی رخ دهد، قبل از رسیدن پزشک، آفت‌کش را از محل آلوده دور کنید. لباس‌های آلوده فوراً از بدن خارج شود، محل آلوده با صابون و آب کافی شستشو داده شود. در صورتی که مقدار قابل ملاحظه‌ای در ۲ ساعت اول خورده شده باشد (به اندازه حجم یک دهان) شستشوی معده توصیه می‌شود. بیمار را وادار به استفراغ ننمایید. ذغال طبی و سولفات سدیم توصیه می‌شود. برچسب آفت‌کش را قبل از هر اقدامی به پزشک نشان دهید.
یدوسولفورون متیل سدیم + مزوسولفورون متیل + ایمن کننده	آتلانتیس	سردرد، سرگیجه، حالت تهوع	در صورت تماس با پوست لباس‌های آلوده را از تن خارج کنید، نقاط آلوده به آفت‌کش را با آب سرد تمیز و صابون به خوبی بشوید. در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید. در صورت استنشاق آفت‌کش، شخص باید به هوای آزاد منتقل و درخواست کمک پزشکی شود. در صورت بلعیدن آفت‌کش فوراً با پزشک تماس گرفته شود. اگر آفت‌کش خورده شده باشد مسموم را با خوراندن مقادیر زیادی آب وادار به استفراغ نمایید، سپس ذغال طبی و سولفات سدیم تجویز شود. اگر مقادیر زیادی از آفت‌کش خورده شده باشد کلیه، کبد و سلول‌های قرمز خون شخص مسموم باید تحت کنترل قرار گیرد.
تیاکلوپرید	بیسکایا	انقباض ماهیچه‌ها، لرزش، اختلال در تنفس و در صورت شدت مسمومیت کندی ضربان قلب، کاهش فشارخون و تشنج موضعی عضلانی	درمان با نظر پزشک انجام شود. مداوا مانند مصرف مواد نیکوتینی است، لذا توصیه می‌شود فشارخون و ضربان نبض مرتباً اندازه‌گیری شود. در صورت بروز ضعف و لرزش، شستشوی معده با آب کافی توصیه می‌شود.

نام عمومی	نام تجاری	علائم مسمومیت	کمک‌های اولیه
اتوکسی سولفورون + تریافامون	کانسیل	در صورتی که مقدار زیادی خورده شده باشد، ناراحتی‌های روده‌ای و معده‌ای، حالت تهوع و احساس سوختن	در صورت تماس با پوست با محلول پلی اتیلن گلیکول ۴۰۰ شستشو داده شوند. در غیر این صورت با مقادیر آب کافی شستشو داده شود. در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید. اگر در اثر سهل‌انگاری مسمومیتی رخ دهد، قبل از رسیدن پزشک، آفت کش را از محل آلوده دور کنید. لباس‌های آلوده فوراً از بدن خارج شود، محل آلوده با صابون و آب کافی شستشو داده شود. معمولاً نیازی به شستشوی معده نیست. در صورتی که مقدار قابل ملاحظه‌ای خورده شده باشد (به اندازه حجم یک دهان) ذغال طبی و سولفات سدیم تجویز می‌شود.
اسپیروکسامین + تبوکونازول + تریادیمنول	فالکن	علائم خاصی ندارد.	در صورت احتمال بیهوشی، شخص را از محل آلوده دور نمانید، او را به حالت استراحت قرار دهید و لباس‌های آلوده را از تن خارج کنید. در صورت تماس با پوست، نقاط آلوده را فوراً با صابون و آب کافی تمیز کنید، درخواست کمک پزشکی کنید. در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید. بیمار را وادار به استفراغ ننمایید. در صورت خورده شدن ابتدا شستشوی معده و سپس ذغال طبی و سولفات سدیم تجویز می‌شود.
تریفلوکسیاستروبین	فلینت	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع	در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید.
تبوکونازول	فولیکور راکسیل	تهوع و دل درد	در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید. هنگام بروز مسمومیت تا رسیدن پزشک شخص مسموم را در هوای آزاد خوابانیده و بدن او را به وسیله بالاپوشی گرم نگهدارید. بیمار را وادار به استفراغ ننمایید.

فهرست پادزهرهای آفت‌کش‌های مجاز کشاورزی کشور

نام عمومی	نام تجاری	علائم مسمومیت	کمک‌های اولیه
پروپاموکارب هیدروکلراید + فلوپیکولید	این فینیتو	علائم خاصی ندارد.	در صورت تماس با پوست با محلول پلی‌اتیلن‌گلایکول ۴۰۰ شستشو داده شوند. در غیر این صورت با مقادیر آب کافی شستشو داده شود. لباس‌ها را از تن خارج نمایید. در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید. در صورت خورده شدن، شخص مسموم را وادار به استفراغ ننمایید. اگر مقدار زیادی خورده شده باشد، ذغال طبی و سولفات سدیم تجویز می‌شود و نیازی به شستشوی معده نیست. بیمار را در حالت استراحت قرار دهید، کمک‌های اولیه و سم‌زدایی توسط پزشک انجام شود.
پروتیوکونازول + تبوکونازول	لاماردور	سردرد، سرگیجه، حالت تهوع و احتمالا خارش دست در صورت تماس با سم	در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید.
تریفلوکسیاستروبین + فلوپیرام	لوناسن سیشن	سردرد، سرگیجه، حالت تهوع و دل درد	در صورت تماس با پوست، نقاط آلوده را فوراً با پلی‌اتیلن‌گلایکول ۴۰۰ شستشو دهید و در صورت موجود نبودن با صابون و آب کافی تمیز کنید. در صورت خورده شدن ابتدا شستشوی معده و سپس ذغال طبی و سولفات سدیم تجویز می‌شود. شخص مسموم را وادار به استفراغ ننمایید. درخواست کمک پزشکی کنید. در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید. اگر در اثر سهل‌انگاری مسمومیتی رخ دهد، قبل از رسیدن پزشک، آفت‌کش را از محل آلوده دور کنید. لباس‌های آلوده فوراً از بدن خارج شود، محل آلوده با صابون و آب کافی شستشو داده شود. برچسب آفت‌کش را قبل از هر اقدامی به پزشک نشان دهید.

نام عمومی	نام تجاری	علائم مسمومیت	کمک‌های اولیه
فورامسولفورون + یدوسولفورون	مایستر	ترشح بزاق دهان، کاهش تنفس، رخوت، نارسایی‌های تنفسی	در صورت تماس با پوست آنها را با پلی‌اتیلن‌گلایکول ۴۰۰ و در صورت موجود نبودن با آب کافی شستشو دهید. در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید. اگر در اثر سهل‌انگاری مسمومیتی رخ دهد، قبل از رسیدن پزشک، آفت‌کش را از محل آلوده دور کنید. لباس‌های آلوده فوراً از بدن خارج شود، محل آلوده با صابون و آب کافی شستشو داده شود. برچسب آفت‌کش را قبل از هر اقدامی به پزشک نشان دهید.
اسپیرومسیفن	ابرون	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع	در صورت تماس با پوست، لباس‌های آلوده از تن خارج شود. نقاط آلوده با ماده پلی‌اتیلن‌گلایکول ۴۰۰ و یا آب کافی و صابون به خوبی شستشو داده شود. در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید. در صورت خورده شدن، مسموم را با مقادیر زیادی آب وادار به استفراغ نمایید، مصرف ذغال طبی و سولفات سدیم تجویز می‌شود، فوراً درخواست کمک پزشکی کنید. در صورت استنشاق، آفت‌کش را به هوای آزاد منتقل و درخواست کمک پزشکی کنید.
یدوسولفورون متیل - سدیم + مزوسولفورون متیل + دیفلوفنیکان + ایمن‌کننده	اتللو	علائم خاصی ندارد	مسموم را از منطقه آلوده دور کنید. او را به حالت استراحت (به یک طرف) بخوابانید و لباس‌های آلوده را از تن خارج کنید. مناطق آلوده پوست را با پلی اتیلن‌گلایکول ۴۰۰ و آب فراوان به خوبی شستشو دهید. در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید. در صورت خورده شدن، بیمار را وادار به استفراغ ننمایید. دهان را شستشو دهید و فوراً درخواست کمک پزشکی کنید.
فن‌مدیفام + دسمدیفام + اتوفومازیت	بتانال پروگرس	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع	لباس‌های آلوده را بلافاصله از تن خارج کنید. پوست و چشم‌های آلوده به آفت‌کش را با مقدار آب کافی و تمیز شستشو دهید. اگر آفت‌کش خورده شده باشد، بیمار را وادار به استفراغ ننمایید و فوراً درخواست کمک پزشکی کنید. برچسب روی قوطی آفت‌کش را نشان دهید. معده شخص مسموم را با خوراندن آب شستشو دهید. از دادن تنفس مصنوعی به بیمار خودداری کنید.

فهرست پادزهرهای آفت‌کش‌های مجاز کشاورزی کشور

نام عمومی	نام تجاری	علائم مسمومیت	کمک‌های اولیه
اسپیروترامات	موننتو	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع	در صورت تماس با پوست با پلی‌اتیلن‌گلیکول ۴۰۰ و در صورت در دسترس نبودن، با آب کافی شستشو داده شود. در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید. در صورت خورده شدن، دهان شخص مسموم را بشویید. او را وادار به استفراغ ننمایید. درخواست کمک پزشکی کنید.
فوزتیل آلومینیوم + پروپاموکارب هیدروکلراید	پروپیکور انرژی	بیحالی، ناهماهنگی ماهیچه‌ها، گرفتگی عضلات	در صورت تماس با پوست با مقادیر آب کافی شستشو داده شوند. لباس‌ها را از تن خارج نمایید. در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید. در صورت خورده شدن، شخص مسموم را وادار به استفراغ ننمایید. اگر مقدار زیادی خورده شده باشد، ذغال طبی و سولفات سدیم تجویز می‌شود و نیازی به شستشوی معده نیست. بیمار را در حالت استراحت قرار دهید، کمک‌های اولیه و سم‌زدایی توسط پزشک انجام شود..
نیاکلوپرید + دلتامترین	پروتئوس	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع	در صورت تماس با پوست، لباس‌های آلوده را از تن خارج کنید. نقاط آلوده را با ماده پلی‌اتیلن‌گلیکول ۴۰۰ و یا با آب تمیز و صابون به خوبی شستشو دهید. در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید. در صورت استنشاق، شخص به هوای آزاد انتقال داده شود و با پزشک تماس بگیرید. در صورت بلعیده شدن، فوراً درخواست کمک پزشکی کنید.

نام عمومی	نام تجاری	علائم مسمومیت	کمک‌های اولیه
پروموکسینیل + توفوردی	بوکتریل یونیورسال	خستگی، تشنگی، عرق کردن، اضطراب، کاهش تنفس، سفت شدن عضلات، بالا رفتن درجه حرارت، تهوع، شکم‌درد، ناهماهنگی عضلات، بی- اشتهایی، آسیب کبدی، کاهش فشارخون، اختلال در گردش خون، سرفه، اسهال، خواب‌آلودی، بی‌هوشی، تشنج	ابتدا تنفس، قلب، کبد و کلیه شخص مسموم مورد بررسی قرار گیرد، میزان قلیایی بودن ادرار و خون آزمایش شود. در صورت بالا بودن حرارت بدن، کاهش فیزیکی درجه حرارت به همراه تنفس مصنوعی توصیه می‌شود، گرفتگی عضلات را با ماساژ برطرف نمایید. در صورت تماس با پوست، آنها را با پلی‌اتیلن‌گلیکول ۴۰۰ و در صورت موجود نبودن با آب کافی شستشو دهید. در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید. اگر در اثر سهل‌انگاری مسمومیتی رخ دهد، قبل از رسیدن پزشک، آفت‌کش را از محل آلوده دور کنید. لباس‌های آلوده فوراً از بدن خارج شود، محل آلوده با صابون و آب کافی شستشو داده شود. شخص مسموم را وادار به استفراغ ننمایید. برچسب سم را قبل از هر اقدامی به پزشک نشان دهید.
فلوپیرادیفوران	سیوانتو	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع	در صورت خورده شدن در ۲ ساعت اول پس از مسمومیت، شستشوی معده با آب کافی توصیه می‌شود. مصرف ذغال طبی و سولفات سدیم نیز توصیه می‌شود.
تیامتوکسام	اکتاراکروزر مموری	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع، اختلال در بینایی	در صورت بروز مسمومیت باید به پزشک اطلاع داده شود و تا رسیدن پزشک، مسموم را از محل کار دور کرده و در جایی که هوا کاملاً جریان دارد قرار دهید. در صورت ریخته شدن آفت‌کش بر روی دست و صورت فوراً محل را با آب فراوان به مدت ۱۵ دقیقه شستشو نمایید. در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید. هرگز مسموم بی‌هوش را وادار به استفراغ ننمایید و به او چیزی خورانده نشود.
آزوکسی استروبین + سایپروکونازول	آمیستار اکسترا	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع	در صورت بروز علائم مسمومیت کار را متوقف کرده، شخص مسموم را به محلی که هوای سالم کاملاً جریان دارد قرار دهید و پزشک را مطلع نمایید. در صورت ریخته شدن آفت‌کش بر روی صورت و بدن لباس‌های آلوده را درآورده صورت و بدن را با آب و صابون بشوید. در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید. هرگز به شخص مسموم چیزی خورانده نشود.

فهرست پادزهرهای آفت‌کش‌های مجاز کشاورزی کشور

نام عمومی	نام تجاری	علائم مسمومیت	کمک‌های اولیه
پروپیکونازول + سایپروکونازل	آرتفا	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع، اختلال در بینایی	در صورت بروز مسمومیت تا رسیدن پزشک، مسموم را از محل کار دور کرده و در جایی که هوای سالم کاملاً جریان دارد قرار دهید. برچسب آفت‌کش را به پزشک نشان دهید. در صورت ریخته شدن آفت‌کش بر روی دست و صورت فوراً محل را با آب و صابون به مدت ۱۵ دقیقه شستشو داده و پزشک را مطلع نمایید. چنانچه آفت‌کش خورده شود از ذغال طبی به همراه آب فراوان به دفعات استفاده و بلافاصله به پزشک مراجعه شود. هرگز به شخص مسموم که بیهوش شده است چیزی نخورانید و او را وادار به استفراغ ننمایید. در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید.
پینوکسادن	اکسیال	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع، اختلال در بینایی	در صورت بروز مسمومیت تا رسیدن پزشک، مسموم را از محل کار دور کرده و در جایی که هوای سالم کاملاً جریان دارد قرار دهید، برچسب آفت‌کش را به پزشک نشان دهید. در صورت ریخته شدن آفت‌کش بر روی دست و صورت فوراً محل را با آب و صابون به مدت ۱۵ دقیقه شستشو داده و پزشک را مطلع نمایید. چنانچه آفت‌کش خورده شود از ذغال طبی به همراه آب فراوان به دفعات استفاده و بلافاصله به پزشک مراجعه شود. هرگز به شخص مسموم که بیهوش شده است چیزی نخورانید و او را وادار به استفراغ ننمایید. در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید.
پی‌متروزین	چس	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع	باید به پزشک اطلاع داده شود و تا رسیدن پزشک، مسموم را از محل کار دور کنید و در جایی که هوا کاملاً جریان دارد قرار دهید. در صورت ریخته شدن آفت‌کش بر روی دست و صورت فوراً محل را با آب و صابون فراوان شستشو نمایید. در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید. چنانچه آفت‌کش خورده شود، از ذغال طبی به همراه آب فراوان و به دفعات استفاده و بلافاصله به پزشک مراجعه شود. هرگز مسموم بیهوش را وادار به استفراغ ننمایید و به او چیزی خورانده نشود.

نام عمومی	نام تجاری	علائم مسمومیت	کمک‌های اولیه
کلروتالونیل	داکونیل	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع، احتمال ایجاد کهیر پوستی در افراد حساس	در صورت بروز علائم مسمومیت کار را متوقف کرده، شخص مسموم را به محلی که هوای سالم کاملاً جریان دارد قرار دهید و پزشک را مطلع نمایید. در صورت ریخته شدن آفت‌کش بر روی صورت و بدن لباس‌های آلوده را درآورده صورت و بدن را با آب و صابون بشویید. در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید. هرگز به شخص مسموم چیزی خورانده نشود.
دای کامبا+توفوردی	دیالان سوپر	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع، اختلال در بینایی	در صورت بروز مسمومیت فوراً کار را متوقف کرده و به پزشک اطلاع دهید و برچسب آفت‌کش را به وی نشان دهید و تا رسیدن پزشک شخص مسموم را از محل دور کرده و در جایی که هوای کاملاً سالم جریان دارد قرار دهید. در صورت تماس آفت‌کش با پوست دست یا صورت، محل را با آب و صابون فراوان شستشو دهید. در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید. در صورت استنشاق ذرات آفت‌کش، شخص مسموم را در محلی که جریان هوای تازه در آنجا جریان دارد انتقال دهید. در صورت خورده شدن آفت‌کش، از ذغال طبی با مقدار زیادی آب به دفعات استفاده کنید. در صورتی که مقدار زیادی از آفت‌کش خورده شده باشد انجام درمان ویژه ضروری است.
تیامتوکسام+ لامبداسای هالوترین	افوریا	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع	در صورت بروز مسمومیت باید به پزشک اطلاع داده شود و تا رسیدن پزشک، مسموم را از محل کار دور کرده و در جایی که هوای سالم جریان دارد قرار دهید. در صورت ریخته شدن آفت‌کش بر روی دست و صورت فوراً محل را با آب و صابون فراوان شستشو نمایید. در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید. چنانچه آفت‌کش خورده شود، از ذغال طبی به همراه آب فراوان به دفعات استفاده شود و بلافاصله به پزشک مراجعه شود. هرگز مسموم بیهوش را وادار به استفراغ ننمایید و به او چیزی خورانده نشود.

فهرست پادزهرهای آفت‌کش‌های مجاز کشاورزی کشور

نام عمومی	نام تجاری	علائم مسمومیت	کمک‌های اولیه
فلوآزیفوپ پی بوتیل	فوزیلید فورته فوزیلید	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع، اختلال در بینایی	در صورت بروز مسمومیت باید به پزشک اطلاع داده شود و تا رسیدن پزشک، مسموم را از محل کار دور کرده و در جایی که هوای سالم جریان دارد قرار دهید. در صورت ریخته شدن آفت‌کش بر روی دست و صورت فوراً محل را با آب و صابون فراوان شستشو نمایید. در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید. چنانچه آفت‌کش خورده شود، از ذغال طبی به همراه آب فراوان به دفعات استفاده و بلافاصله به پزشک مراجعه شود. هرگز مسموم بیهوش را وادار به استفراغ ننمایید و به او چیزی خورانده نشود.
لامبدا سای هالوترین	کاراته‌زنون	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع	در صورت بروز مسمومیت باید به پزشک اطلاع داده شود و تا رسیدن پزشک، مسموم را از محل کار دور کرده و در جایی که هوا جریان دارد قرار دهید. در صورت ریخته شدن آفت‌کش بر روی دست و صورت فوراً محل را با آب و صابون فراوان شستشو نمایید. در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید. چنانچه آفت‌کش خورده شود، از ذغال طبی به همراه آب فراوان به دفعات استفاده و بلافاصله به پزشک مراجعه شود. هرگز مسموم بیهوش را وادار به استفراغ ننمایید و به او چیزی خورانده نشود.
دای کامبا+تریاسولفورون	لینتور	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع، اختلال در بینایی	در صورت بروز مسمومیت فوراً کار را متوقف کرده و به پزشک اطلاع دهید و برچسب آفت‌کش را به وی نشان دهید. تا رسیدن پزشک شخص مسموم را از محل دور کرده و درمان بر حسب بروز علائم انجام شود. در صورت تماس آفت‌کش با پوست دست یا صورت، محل را با آب و صابون فراوان شستشو دهید. در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید. در صورت استنشاق ذرات آفت‌کش، شخص مسموم را در محلی که جریان هوای تازه در آنجا جریان دارد انتقال دهید. در صورت خورده شدن آفت‌کش، از ذغال طبی با مقدار زیادی آب به دفعات استفاده کنید. در صورتی که مقدار زیادی از آفت‌کش خورده شده باشد انجام درمان ویژه ضروری است. هرگز به شخص مسموم که بیهوش شده است چیزی نخورانید و او را وادار به استفراغ ننمایید.

نام عمومی	نام تجاری	علائم مسمومیت	کمک‌های اولیه
لوفنورون + فنوکسی کرب	لوفوکس	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع	در صورت بروز مسمومیت باید به پزشک اطلاع داده شود و تا رسیدن پزشک، مسموم را از محل کار دور کرده و در جایی که هوا کاملاً جریان دارد قرار دهید. در صورت ریخته شدن آفت‌کش بر روی دست و صورت فوراً محل را با آب و صابون فراوان شستشو نمایید. در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید. چنانچه آفت‌کش خورده شود، از ذغال طبی به همراه آب فراوان به دفعات استفاده و بلافاصله به پزشک مراجعه شود. هرگز مسموم بیهوش را وادار به استفراغ ننمایید و به او چیزی خورانده نشود.
اس‌متولاکلر + تربوتیل‌ازین + مزوتریون	لوماکس	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع	در صورت بروز مسمومیت باید به پزشک اطلاع داده شود و تا رسیدن پزشک، مسموم را از محل کار دور کرده و در جایی که هوا کاملاً جریان دارد قرار دهید. در صورت ریخته شدن آفت‌کش بر روی دست و صورت فوراً محل را با آب و صابون فراوان شستشو نمایید. در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید. چنانچه آفت‌کش خورده شود، از ذغال طبی به همراه آب فراوان به دفعات استفاده و بلافاصله به پزشک مراجعه شود. هرگز مسموم بیهوش را وادار به استفراغ ننمایید و به او چیزی خورانده نشود.
لوفنورون	مچ	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع	در صورت بروز مسمومیت باید به پزشک اطلاع داده شود و تا رسیدن پزشک، مسموم را از محل کار دور کرده و در جایی که هوا کاملاً جریان دارد قرار دهید. در صورت ریخته شدن آفت‌کش بر روی دست و صورت فوراً محل را با آب و صابون فراوان شستشو نمایید. در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید. چنانچه آفت‌کش خورده شود، از ذغال طبی به همراه آب فراوان به دفعات استفاده و بلافاصله به پزشک مراجعه شود. هرگز مسموم بیهوش را وادار به استفراغ ننمایید و به او چیزی خورانده نشود.

فهرست پادزهرهای آفت‌کش‌های مجاز کشاورزی کشور

نام عمومی	نام تجاری	علائم مسمومیت	کمک‌های اولیه
آزوکسیاستروبین +دیفنوکونازول	ارتیواتاپ	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع	در صورت بروز علائم مسمومیت کار را متوقف کرده، شخص مسموم را به محلی که هوای سالم کاملاً جریان دارد قرار دهید و پزشک را مطلع نمایید. در صورت ریخته شدن آفت‌کش بر روی صورت و بدن لباس‌های آلوده را درآورده صورت و بدن را با آب و صابون بشویید. در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید. هرگز به شخص مسموم چیزی خورانده نشود.
امامکتین بنزوات+ لوفنورون	پروکلیم فیت	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع	در صورت بروز علائم مسمومیت کار را متوقف کرده، شخص مسموم را به محلی که هوای سالم کاملاً جریان دارد قرار دهید و پزشک را مطلع نمایید. در صورت ریخته شدن آفت‌کش بر روی صورت و بدن لباس‌های آلوده را درآورده صورت و بدن را با آب و صابون بشویید. در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید. هرگز به شخص مسموم چیزی خورانده نشود.
پرتیلاکلر	ریفیت	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع	در صورت بروز مسمومیت، محلولپاشی را متوقف نمایید و مسموم را از محل دور کنید. به پزشک اطلاع دهید و برچسب آفت‌کش را به وی نشان دهید. در صورت خورده شدن سم به مسموم مواد قی‌آور (ذغال طبی با مقدار زیادی آب) خورانده شود. در صورتی که مسموم در حالت بیهوشی باشد هرگز او را وادار به خوردن نکنید. چنانچه آفت‌کش روی بدن ریخته شود فوراً محل آن را با آب و صابون فراوان بشویید.
سولفور	تیوویت جت	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع	در صورت بروز مسمومیت، محلولپاشی را متوقف نمایید و مسموم را از محل دور کنید. به پزشک اطلاع دهید و برچسب آفت‌کش را به وی نشان دهید. در صورت خورده شدن سم به مسموم مواد قی‌آور (ذغال طبی با مقدار زیادی آب) خورانده شود. در صورتی که مسموم در حالت بیهوشی باشد هرگز او را وادار به خوردن نکنید. چنانچه آفت‌کش روی بدن ریخته شود فوراً محل آن را با آب و صابون فراوان بشویید.

نام عمومی	نام تجاری	علائم مسمومیت	کمک‌های اولیه
پنکونازول	توپاز	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع	در صورت بروز علائم مسمومیت کار را متوقف کرده، شخص مسموم را به محلی که هوای سالم کاملاً جریان دارد قرار دهید و پزشک را مطلع نمایید. در صورت ریخته شدن آفت‌کش بر روی صورت و بدن لباس‌های آلوده را در آورده صورت و بدن را با آب و صابون بشویید. در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید. هرگز به شخص مسموم چیزی خورانده نشود.
کلودینوفوب پروپارژیل	تاپیک	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع، اختلال در بینایی	در صورت بروز مسمومیت فوراً کار را متوقف کرده و به پزشک اطلاع دهید و برچسب آفت‌کش را به وی نشان دهید، تا رسیدن پزشک شخص مسموم را از محل دور کرده و در جایی که هوای کاملاً سالم جریان دارد قرار دهید. در صورت تماس آفت‌کش با پوست دست یا صورت، محل را با آب و صابون فراوان شستشو دهید. در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید. در صورت استنشاق ذرات آفت‌کش، شخص مسموم را در محلی که جریان هوای تازه در آنجا جریان دارد انتقال دهید. در صورت خورده شدن آفت‌کش، از ذغال طبی با مقدار زیادی آب به دفعات استفاده کنید. در صورتی که مقدار زیادی از آفت‌کش خورده شده باشد انجام درمان ویژه ضروری است. هرگز به شخص مسموم که بیهوش شده است چیزی نخورانید و او را وادار به استفراغ ننمایید.
پینوکسادن + کلودینوفوب پروپارژیل	تراکسوس	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع	در صورت بروز مسمومیت فوراً کار را متوقف کرده و به پزشک اطلاع دهید و برچسب آفت‌کش را به وی نشان دهید، تا رسیدن پزشک شخص مسموم را از محل دور کرده و در جایی که هوای کاملاً سالم جریان دارد قرار دهید. در صورت تماس آفت‌کش با پوست دست یا صورت، محل را با آب و صابون فراوان شستشو دهید. در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید. در صورت استنشاق ذرات آفت‌کش، شخص مسموم را در محلی که جریان هوای تازه در آنجا جریان دارد انتقال دهید. در صورت خورده شدن آفت‌کش، از ذغال طبی با مقدار زیادی آب به دفعات استفاده کنید. در صورتی که مقدار زیادی از آفت‌کش خورده شده باشد انجام درمان ویژه ضروری است. هرگز به شخص مسموم که بیهوش شده است چیزی نخورانید و او را وادار به استفراغ ننمایید.

فهرست پادزهرهای آفت‌کش‌های مجاز کشاورزی کشور

نام عمومی	نام تجاری	علائم مسمومیت	کمک‌های اولیه
سیرومازین	تریگارد	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع، اختلال در بینایی	در صورت بروز مسمومیت فوراً کار را متوقف کرده و به پزشک اطلاع دهید و برچسب آفت‌کش را به وی نشان دهید، تا رسیدن پزشک شخص مسموم را از محل دور کرده و در جایی که هوای کاملاً سالم جریان دارد قرار دهید. در صورت تماس آفت‌کش با پوست دست یا صورت، محل را با آب و صابون فراوان شستشو دهید. در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید. در صورت استنشاق ذرات آفت‌کش، شخص مسموم را در محلی که جریان هوای تازه در آنجا جریان دارد انتقال دهید. در صورت خورده شدن آفت‌کش، از ذغال طبی با مقدار زیادی آب به دفعات استفاده کنید. در صورتی که مقدار زیادی از آفت‌کش خورده شده باشد انجام درمان ویژه ضروری است. هرگز به شخص مسموم که بیهوش شده است چیزی نخورانید و او را وادار به استفراغ ننمایید.
آبامکتین	ور تیمک	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع، اختلال در بینایی	درمان بر حسب بروز علائم انجام شود. در صورت بروز مسمومیت باید به پزشک اطلاع داده شود و تا رسیدن پزشک، مسموم را از محل کار دور کرده و در جایی که هوا کاملاً جریان دارد قرار دهید. در صورت ریخته شدن آفت‌کش بر روی دست و صورت فوراً محل را با آب و صابون فراوان شستشو نمایید. در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید. چنانچه آفت‌کش خورده شود، از ذغال طبی به همراه آب فراوان به دفعات استفاده شود و بلافاصله به پزشک مراجعه شود. هرگز مسموم بیهوش را وادار به استفراغ ننمایید و به او چیزی خورانده نشود.
آلفاسایپر مترین + تفلوبنزورون	ایمونیت	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع، اختلال در بینایی و خارش پوست	در صورت بروز مسمومیت باید به پزشک اطلاع داده شود. در صورت ریخته شدن آفت‌کش بر روی دست و صورت فوراً محل را با آب و صابون فراوان شستشو نمایید. در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید. هرگز مسموم بیهوش را وادار به استفراغ ننمایید و به او چیزی خورانده نشود. در صورت خورده شدن به سرعت دهان فرد را بشویید و مقدار فراوانی آب بنوشانید و فرد را وادار به استفراغ ننمایید.

نام عمومی	نام تجاری	علائم مسمومیت	کمک‌های اولیه
مپیکوات کلراید	پیکس	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع	درمان بر حسب بروز علائم انجام شود. در صورت بروز مسمومیت باید به پزشک اطلاع داده شود و تا رسیدن پزشک، مسموم را از محل کار دور کرده و در جایی که هوا کاملاً جریان دارد قرار دهید. در صورت ریخته شدن ترکیب بر روی صورت و بدن لباس‌های آلوده را درآورده صورت و بدن را با آب و صابون بشویید. در صورت خورده شدن، بیمار را وادار به استفراغ نمایید به بیمار اجازه کشیدن سیگار، خوردن شیر، الکل و یا روغن را ندهید، از ذغال طبی به همراه آب فراوان به دفعات استفاده شود.
ایمازاتاپیر	پرسوئیت	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع، اختلال در بینایی	درمان بر حسب بروز علائم انجام شود. در صورت بروز مسمومیت باید به پزشک اطلاع داده شود و تا رسیدن پزشک، مسموم را از محل کار دور کرده و در جایی که هوا کاملاً جریان دارد قرار دهید. در صورت ریخته شدن آفت‌کش بر روی صورت و بدن لباس‌های آلوده را درآورده صورت و بدن را با آب و صابون بشویید. به بیمار اجازه کشیدن سیگار، خوردن شیر، الکل و یا روغن را ندهید.
اپوکسی کونازول+ تیوفانات متیل	رکس‌دو	سردرد و سرگیجه	هرگز به مسموم چیزی خوراندن نشود و درمان بر حسب بروز علائم انجام شود. در صورت بروز مسمومیت باید به پزشک اطلاع داده شود و تا رسیدن پزشک، مسموم را از محل کار دور کرده و در جایی که هوا کاملاً جریان دارد قرار دهید. در صورت ریخته شدن آفت‌کش بر روی صورت و بدن لباس‌های آلوده را درآورده صورت و بدن را با آب و صابون بشویید. در صورت آلودگی چشمی شستشوی چشم‌ها با آب و یا نرمال سالین به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در صورت نیاز این عمل به دفعات تکرار شود. مراجعه به چشم پزشک برای بررسی‌های بیشتر توصیه می‌شود. در صورتی که شخص دارای لنز چشمی است، آنها را خارج کنید و چشم‌ها را شستشو دهید.
کروزکسیم متیل	استروبی	سردرد، سرگیجه و حالت تهوع، اختلال در بینایی	درمان بر حسب بروز علائم انجام شود. در صورت بروز مسمومیت باید به پزشک اطلاع داده شود و تا رسیدن پزشک، مسموم را از محل کار دور کرده و در جایی که هوا کاملاً جریان دارد قرار دهید. در صورت ریخته شدن آفت‌کش بر روی صورت و بدن لباس‌های آلوده را درآورده صورت و بدن را با آب و صابون بشویید. به بیمار اجازه کشیدن سیگار، خوردن شیر، الکل و یا روغن را ندهید.

*** در موارد مسمومیت با آفت‌کش‌های آماده مصرف که حاوی حلال‌های آلی و سمی هستند، القای تهوع و استفراغ در بیمار ممنوع است و موجب تشدید و وخامت وضعیت بالینی بیمار می‌شود.**

*** در موارد مسمومیت با آفت‌کش‌هایی که فاقد پادزهر اختصاصی هستند در صورت بروز مسمومیت، بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی، اقدامات درمانی به صورت علامتی و حمایتی انجام شود.**

پادزهرهای توصیه شده آفت کش‌های قدیمی پرخطر

نام عمومی	نام تجاری	پادزهر
اتیون	اتیول	آتروپین و اکسیم ها مانند پرالیدوکسیم و ابیدوکسیم
اکسی دیمتون متیل	متاسیستوکس آر	سولفات آتروپین- رالیدوکسیم و توگزوگونین- رالیدوکسیم و توگزوگونین با سولفات آتروپین
پروفنفسوس	کوراکرون	آتروپین و دیپازم و اکسیم‌های فعال کننده مثل توگزوگونین، ابیدوکسیم (Obidoxime) با نام تجاری توکسوگونین (Toxogonin®)
پریمیکارب	پیریمور	آتروپین
تری کلرفون	دیپترکس	سولفات آتروپین - پرالیدوکسیم و توگزوگونین، توگزوگونین همراه با آتروپین
تیودیکارب	لاروین	سولفات آتروپین - پرالیدوکسیم توصیه نمی‌شود - از مصرف تارکوتیکس و سایر داروهای آرام‌بخش خودداری می‌شود.
دلتامترین	دسیس	دیازپام، پادزهر واقعی نیست و فقط سیستم اعصاب مرکزی را تسکین می‌دهد
دیازینون	بازودین	آتروپین و اکسیم ها مانند پرالیدوکسیم و ابیدوکسیم (Obidoxime) با نام تجاری توکسوگونین (Toxogonin®)
دیکلرووس	ددواپ	آتروپین - پرالیدوکسیم - آتروپین با پام
دیمتوات	روکسیون	آتروپین و اکسیم ها مانند پیرالدوکسیم و ابیدوکسیم (Obidoxime) با نام تجاری توکسوگونین (Toxogonin®)
فن پروپاترین	دانیتول	دیازپام، پادزهر واقعی نیست و فقط سیستم اعصاب مرکزی را تسکین می‌دهد
فنیترتیون	سومیتیون	آتروپین و اکسیم ها مانند پیرالدوکسیم و ابیدوکسیم (Obidoxime) با نام تجاری توکسوگونین (Toxogonin®)
فوزالون	زولن	آتروپین و اکسیم ها مانند پیرالدوکسیم و ابیدوکسیم (Obidoxime) با نام تجاری توکسوگونین (Toxogonin®)
کارتاپ	پادان	Dimercaprol
یریفوس	دورسبان	آتروپین و اکسیم ها مانند پیرالدوکسیم و ابیدوکسیم (Obidoxime) با نام تجاری توکسوگونین (Toxogonin®)
کلرپیریفوس متیل	رلدان	آتروپین و اکسیم ها مانند پیرالدوکسیم و ابیدوکسیم (Obidoxime) با نام تجاری توکسوگونین (Toxogonin®)
کلرپیریفوس + کلرپیریفوس متیل	گلادیاتور TC ^o	آتروپین و اکسیم ها مانند پیرالدوکسیم و ابیدوکسیم (Obidoxime) با نام تجاری توکسوگونین (Toxogonin®)
مالاتیون	مالاتیون	آتروپین و اکسیم ها مانند پیرالدوکسیم و ابیدوکسیم (Obidoxime) با نام تجاری توکسوگونین (Toxogonin®)
هپتئفوس	هوستاکوئیک	آتروپین - توگزوگونین

نام عمومی	نام تجاری	پادزهر
دینوکاپ	کارتان	فاقد پادزهر اختصاصی، در صورت بروز مسمومیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی، اقدامات درمانی انجام شود. آلودگی زدایی گوارشی در مسمومیت خوراکی با محلول سولفات سدیم
تیوفانات متیل	توپسین ام	انواع باربیتوراتها
کاپتان	ارتوساید - کاپتان	دiazepam، پادزهر واقعی نیست فقط سیستم اعصاب مرکزی را تسکین می دهد.
کوپراکسی کلراید	کوپراویت	D - پنسیسیلامین، دیمر کاپرول، EDTA، Unithiol و دیمر کاپتوپروپان سولفونات
مانکوزب	دیتان M-40	سولفات آتروپین، ویتامین سی
ای پی تی سی	ارادیکان	آتروپین
بوتاکلر	ماچتی	آتروپین
پاراکوات	گراماکسون	ذغال فعال و خاک رس (Fuller's Earth) برای آلودگی زدایی گوارشی در مسمومیت خوراکی، تجویز عوامل آنتی اکسیدان مانند گلوکاتایون، ان - استیل سیستئین و ویتامین E، گلوکوکورتیکوئیدها مانند دگزامتازون و متیل پردنیزولون، عوامل تضعیف کننده سیستم ایمنی مانند سیکلوفسفامید اگر چه به عنوان پادزهر اختصاصی و متداول در مسمومیت با پاراکوات مورد توافق نیست ولی در برخی مقالات ذکر شده است.
پروپانیل	استام	متیلن بلو
توفوردی	U 46 D	این آفت کش پادزهر اختصاصی ندارد ولی تجویز بی کربنات سدیم وریدی از طریق قلبیایی نمودن ادرار در دفع سم از بدن مؤثر است.
توفوردی + ام سی پی آ	U 46 Combi fluid	این آفت کش پادزهر اختصاصی ندارد ولی تجویز بی کربنات سدیم وریدی از طریق قلبیایی نمودن ادرار در دفع سم از بدن مؤثر است.
دیکلوفوپ متیل	ایلوکسان	سولفات سدیم
دینیترامین	کوبکس	انواع باربیتوراتها
دیورون	کارمکس	سولفات سدیم و مواد آرام بخش
سیکلوات	رونیت	آتروپین
کلروتال دی متیل	داکتال	خوراندن محلول آب نمک گرم
گلو فوسینت آمونیوم	بستا	فنوباریتال سدیم و diazepam
لینورون	افالن	مواد آرام بخش
متری بوزین	سنگور - لکسون	مخلوط ذغال طبی و آب
مولینیت	اوردرام	آتروپین
متیو کارب	مزرول	سولفات آتروپین
برودیفاکوم	کلرت	ویتامین K ¹
برومادیالون	لانی رت	ویتامین K ¹

فهرست پادزهرهای آفت‌کش‌های مجاز کشاورزی کشور

نام عمومی	نام تجاری	پادزهر
زینک فسفاید	راتول	راهنمای درمان مسمومیت حاد با فسفید آلومینیوم (قرص برنج) پیوست
سولفاکوئینوکسالین + کلروفاسینون	اكتوسین C	ویتامین K ^۱
کوماتترالیل	راکومین	ویتامین K ^۱
وارفارین	وارفارین	ویتامین K ^۱
تری بوتیل فسفروتتری تیوات	دف	آتروپین و دیازپام و اکسیم‌های فعال کننده مثل توکزوگونین و ابیدوکسیم (Obidoxime) با نام تجاری توکسوگونین (Toxogonin®)