



سازمان حفظ نباتات
معاونت کنترل آفات
دفتر پیش آگاهی

دستورالعمل اجرایی

مدیریت تلفیقی ویروس پیچیدگی زرد برگ گوجه فرنگی

Integrated management of TYLCV



کژال کریمی - بهمن ماه ۱۳۹۸

دستورالعمل شماره: ۹۸۱۲۹۱

بخش اول: اطلاعات آفت

اهمیت و ضرورت:

عامل بیماری پیچیدگی زرد برگ گوجه‌فرنگی، ویروس Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) از تیره ویروس‌های دوقلو (Geminiviridae) و جنس بگوموویروس (Begomovirus) است. این ویروس، یکی از مخرب‌ترین ویروس‌های گیاهی در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان محسوب می‌شود که خسارت آن بین ۵۰ تا ۹۰ درصد در محصول گوجه‌فرنگی گزارش شده است و با توجه به انتشار گسترده آن در بسیاری از نقاط دنیا، بعنوان سومین ویروس از ده ویروس گیاهی مهم دنیا معرفی شده است.

اگر چه مهم‌ترین میزبان این ویروس (TYLCV)، گوجه‌فرنگی (*Solanum lycopersicon*) است اما دامنه میزبانی آن وسیع بوده و قادر به ایجاد آلودگی در بیش از ۳۰ گونه گیاهی از ۱۲ تیره از جمله سبزیجات (خیار، طالبی، فلفل قرمز، فلفل دلمه‌ای، هویج، شنبلیله)، گیاهان زینتی، گیاهان وحشی و گونه‌های مختلف علف‌های هرز (پنیرک، سلمه‌تره، سوروف، تاجریزی و ...) می‌باشد.

برای اولین بار در ایران در سال ۱۳۷۲ از برخی مزارع گوجه‌فرنگی استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان و سپس در فاصله یک دهه از بسیاری استان‌های کشور از قبیل کرمان، بوشهر، خوزستان، مرکزی، اصفهان، تهران، گلستان، مازندران، خراسان رضوی و یزد گزارش و در حال حاضر به یکی از عوامل اصلی کاهش میزان محصول گوجه‌فرنگی در ایران تبدیل گشته است.

زیست‌شناسی و خسارت:

ویروس TYLCV، در طبیعت منحصرأ توسط سفید بالک *Bemisia tabaci* به‌صورت پایا (persistent) منتقل می‌شود. حشره ناقل برای کسب ویروس، بین ۱۵ تا ۳۰ دقیقه زمان لازم داشته و دوره نهان ویروس در بدن ناقل، برای شروع انتقال آلودگی، بین ۸ تا ۲۴ ساعت می‌باشد. اگرچه پوره‌های سفیدبالک هم قادر به انتقال بگوموویروس‌ها هستند، اما نقش اصلی برای انتقال و انتشار آنها به عهده حشرات بالغ بویژه حشرات ماده بوده و فقط ۲۰ درصد حشرات نر، در شرایط سنی مشابه (با سن یک تا دو هفته)، قادر به انتقال آلودگی هستند.

علائم بیماری، معمولاً بسته به شرایط آب و هوایی و رقم گوجه‌فرنگی، دو تا سه هفته پس از اولین تغذیه حشره ناقل روی گیاهچه‌های آلوده ظاهر می‌شود. در صورت آلودگی نشاها، علائم آلودگی بلافاصله بعد از انتقال آنها به زمین اصلی، با سرعت بیشتری ظاهر شده و شدت آلودگی در این گونه مزارع بیشتر خواهد بود. در صورت وقوع آلودگی در مراحل اولیه رشد، کوتولگی شدید بوته گوجه‌فرنگی و کاهش تعداد و اندازه میوه در مزارع براحتی قابل مشاهده می‌باشد. ایجاد آلودگی در مراحل دیرتر، رشد رویشی و تولید میوه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

روش‌های شناسایی بیماری:

?? ?

- زرد شدن حاشیه برگ‌ها
- قاشقی و فنجانی شدن شدید برگ‌های انتهایی
- ریز شدن شدی برگ‌های انتهایی
- کوتولگی بوته‌های گوجه‌فرنگی
- ریزش شدید گل‌ها (گاه‌ها تا ۹۰ درصد) و کاهش شدید میزان میوه و یا ریز شدن میوه‌ها
- وقوع آلودگی قبل از مرحله گلدهی، کاهش شدید میزان محصول بدون مشاهده علائم قابل توجهی در میوه‌های حاصل از گیاهان آلوده

روش‌های سرولوژیکی و مولکولی



علائم زرد شدن، پیچیدگی و کوچک شدن برگ‌ها شکل (۱)

بخش دوم: دستورالعمل اجرایی کنترل

روش‌های پایش و ردیابی:

- پایش جمعیت حشره ناقل در تمام طول فصل کشت
- انجام مستمر پایش و ردیابی مشاهده‌ای در مزرعه
- جمع‌آوری نمونه‌های مشکوک به آلودگی
- انجام سریع آزمون‌های الیزا و PCR

کنترل زراعی و بهداشت گیاهی:

- استفاده از نشاء سالم
- استفاده از ارقام مقاوم یا متحمل به TYLCV
- تغییر تاریخ کاشت (زود کشت کردن در مناطق سردسیر و دیرکشت کردن در مناطق گرمسیری)
- تولید نشاء در مناطقی دور از مزارع گوجه‌فرنگی
- رعایت حداقل سن ۳۰ روز برای نشاهای گوجه‌فرنگی هنگام انتقال به زمین اصلی (سفید بالک علاقه‌مند به تغذیه از بافت برگ گیاهان جوان می‌باشد)
- اجتناب از انتقال نشاهای گوجه‌فرنگی به زمین اصلی در صورت بالا بودن جمعیت حشره ناقل
- رعایت کشت گوجه‌فرنگی با فاصله زمانی و مکانی از سایر میزبان‌ها از قبیل (کلم، کدویان، سویا، پنبه و علف‌های هرز)
- کشت گیاهان تله از قبیل خیار و کدو حلوائی
- کشت ذرت در اطراف مزارع گوجه‌فرنگی
- استفاده از مالچ‌های زرد رنگ
- روغن‌پاشی سطح زیرین برگ‌ها با هدف کنترل حشرات بالغ مسقر شده در زیر برگ‌ها
- حذف بقایای گیاهی در مزارع بلافاصله پس از برداشت
- حذف علف‌های هرز میزبان

کنترل شیمیایی:

یکی از موثرترین راه‌های مدیریت این بیماری، کنترل حشره ناقل است که برای این منظور می‌توان در مرحله گیاهچه، از حشره‌کش‌های سیستمیک ثبت و توصیه شده، با رعایت تناوب در استفاده از گروه‌های مختلف حشره‌کش، به منظور جلوگیری از ایجاد مقاومت، استفاده کرد.

سموم ثبت و توصیه شده

نام تجاری	نام عمومی	میزان مصرف	فرمولاسیون	گروه	IRAC
ددوآپ	دیکلرووس	۰.۵ لیتر در هزار لیتر آب، سبزی‌کاری ۲-۱.۵ لیتر در هزار لیتر آب و گلخانه لیتر ۰.۸ در هزار لیتر آب	EC 50%	ارگانوفسفات	1B
مالاتیون	مالاتیون	۱.۵-۱ لیتر در هزار لیتر آب	EC 57%	ارگانوفسفات	1B
پروتئوس	تیاکلورید + دلتامترین	۱ لیتر در هکتار	OD 11%	نیکوتینوئید و پایروتروئیدها	4A 3A
افوریا	تیامتوکسام + لامبدا سای هالوترین	۰.۳ لیتر در هزار لیتر آب (فقط در گلخانه)	SC 24.7%	نیکوتینوئید و پایروتروئیدها	4A 3A
کروزر	تیامتوکسام	۰.۲۵ لیتر در هکتار (فقط به صورت محلولپاشی)	SC 24%	نیکوتینوئید	4A
استارکل	دینوتفوران	۰.۷۵ کیلوگرم (فقط به صورت محلولپاشی)	SC 20%	نیکوتینوئید	4A
ایرون	اسپیرومسیفن	۰.۴ لیتر در هکتار (فقط به صورت محلولپاشی)	SC 24%	تترونیك و تترامیک اسید	23
مونتو	اسپیروتترامات	۰.۷۵ لیتر - ۷۵۰ میلی لیتر در هزار لیتر آب در گلخانه	SC 10%	تترونیك و تترامیک اسید	23
نیمارین	آزادیراختین	۲.۵ لیتر در هکتار	EC 0.15%	آرومکتین	
کیلونیم	آزادیراختین	۴ لیتر در هزار لیتر آب	EC 0.15%	آرومکتین	
پایروتروم	پیرترین	۴ لیتر در هزار لیتر آب (فقط در گلخانه)	EC 5%	پایروتروئیدها	3A
کیلونیم	آزادیراختین	۴ در هزار	EC3%	آرومکتین	
اگریفلکس	تیامتوکسام + آدامکتین	۰.۷۵ لیتر در هزار لیتر آب (ابتدای فصل و قبل از شروع باردهی)	SC 18.5%	نیکوتینوئید و آرومکتین	4A 6
سیوانتو	فلوپیرادیفوران	۰.۷۵ لیتر در هزار لیتر آب	SL 20%	بوتنولید	4D
نارتورالیس	<i>Beauveria bassiana</i>	۷۵۰ میلی لیتر + ۲ لیتر ماده Nufilm	L 7.16%		
مایکوتال	<i>Lecanicillium muscarium</i>	۱ لیتر در هزار لیتر آب			

بخش سوم: منابع

۱. بنانج ک.: تحلیلی بر وضعیت بیماری ویروسی پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی، بخش تحقیقات ویروس‌های گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، آفات و بیماری‌های گیاهی جلد ۸۴، شماره ۱، شهریور ۱۳۹۵.

2. Cohen S, Nitzany FE, 1966. Transmission and host range of the tomato leaf curl virus. *Phytopathology*, 56:1127-1131.
3. Al-Musa A, 1982. Incidence, economic importance, and control of tomato yellow leaf curl in Jordan. *Plant Disease*, 66(7):561-563
4. Gilbertson RL, Rojas MR, Kon T, Jaquez J, 2007. Introduction of Tomato yellow leaf curl virus into the Dominican Republic: the development of a successful integrated pest management strategy. In: *The Tomato Yellow Leaf Curl Virus Disease: Management, Molecular Biology, Breeding for Resistance* [ed. by Czosnek, H.]. Dordrecht, The Netherlands: Springer, 283-307.
5. CZOSNEK, H. 2007. *Tomato Yellow Leaf Curl Virus Disease: Management, Molecular Biology, Breeding for Resistance*. Springer, ISBN 978-1-4020-4768-8.
6. SCHOLTHOF, K., S. ADKINS, H. CZOSNEK, P. PALUKAITIS, E. JACQUOT, T. HOHN, B. HOHN, K. SAUNDERS, T. CANDRESSE, P. AHLQUIST, C. HEMENWAY and G. FOSTER, 2010. Top 10 plant viruses in molecular plant pathology. *Molecular Plant Pathology* 12: 938-954.
7. RYBICKI, E. 2015. A top ten list for economically-important plant viruses. *Archives of Virology* 160: 17-20.