

قارچ کش های تصویب شده از سال ۱۳۸۶ تا پایان اسفند ۱۴۰۳

ردیف	نام عمومی	نام تجاری	درصد	فرمولاسیون	شرکت	بیماری	محصول	کارنس	دز مصرف	تاریخ تصویب
۱	اسیدهای آمینه	آزینو	۰/۱۳	L	جاوید شیمی فارس	جاروک	لیموترش		۴ در هزار	۱۴۰۳/۶/۲۶
۲	اپوکسی کونازول ۱۸۷ گرم /لیتر+تیوفانات متیل ۳۱۰ گرم/لیتر	رکس دو	۴۹/۷٪	SC	ب آ اس اف	بیماری فوزاریمی سنبله	گندم	۴۲ روز	۰/۵ لیتر در هکتار	۹۲/۳/۲۷
۳	اپوکسی کونازول ۱۸۷ گرم /لیتر+تیوفانات متیل ۳۱۰ گرم/لیتر	رکس دو	۴۹/۷٪	SC	ب آ اس اف	زنگ زرد	گندم	۴۲ روز	۰/۵ لیتر در هکتار	۹۷/۶/۲۷
۴	اپوکسی کونازول ۱۸۷ گرم /لیتر+تیوفانات متیل ۳۱۰ گرم/لیتر	رکس دو	۴۹/۷٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	چغندر قند	-	۰/۵ لیتر در هکتار	۹۷/۷/۱۶
۵	آزوکسی استروبین ۲۰۰ گرم/لیتر+ دیفنو کونازول ۱۲۵ گرم/لیتر	ارتیواتاپ	۳۲/۵٪	SC	سینجنتا	سفیدک پودری	جالیز- مزرعه.گلخانه	خیار: ۲ روز	مزرعه: ۱ لیتر در هکتار	۸۸/۹/۳۰
								۲ روز گوجه فرنگی:	گلخانه: ۰/۷۵ در هزار	
۶	آزوکسی استروبین ۲۰۰ گرم/لیتر+ دیفنو کونازول ۱۲۵ گرم/لیتر	ارتیواتاپ	۳۲/۵٪	SC	سینجنتا	لکه برگ سرکوسپورایی	چغندر قند	-	۱ لیتر در هکتار	۹۹/۱۰/۲۲
۷	آزوکسی استروبین ۲۰۰ گرم/لیتر+ دیفنو کونازول ۱۲۵ گرم/لیتر	ارتیواتاپ	۳۲/۵٪	SC	سینجنتا	لکه موجی	گوجه فرنگی	۳ روز	۱۳۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۸	آزوکسی استروبین+ دیفنو کونازول	سفیر	۳۲/۵٪	SC	بارزگانان سرای سپند	سفیدک پودری	خیار گلخانه	-	۰/۷۵ در هزار حداکثر دو بار سمپاشی	۹۷/۷/۱۶

۹	آزوکسی استروبین + دیفنو کونازول	دیفوروبین	۳۲/۵%	SC	کاوش کیمیای کرمان	سفیدک پودری	خیار گلخانه	-	۰/۷۵ در هزار حداکثر دو بار سمپاشی	۹۷/۷/۱۶
۱۰	آزوکسی استروبین + سیپروکونازول	آمیستاراکسترا	۲۸%	SC	سینجتا	زنگ زرد	گندم	۳۵ روز	۰/۷۵ لیتر در هکتار	۹۲/۸/۲۷
۱۱	آزوکسی استروبین ۲۰% +سیازوفامید ۱۰%	سیازوبین	۳۰%	SC	پاک سم ایرانیان	سفیدک کرکی	خیار	۳ روز	۱/۲ میلی لیتر در هزار	۱۴۰۳/۹/۵
					Tianjin Highpoint Plant Protection					
۱۲	آزوکسی استروبین ۱۲۵g/l+دیفنوکونازول ۱۲۵ g/l	بیکانتا	۲۵%	SC	سینجتا	سپتوریای برگ	گندم		یک لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۱۱/۳
۱۳	اسپیروکسامین	پروسپر	۳۰%	CS	بایراگ	سفیدک سطحی	انگور	۱۴ روز	۰/۷ در هزار در مرحله جوانه زنی شاخه ها و با فاصله ۱۴ روز از سمپاشی اول یا دز ۱/۲ در هزار	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۱۶	اکسی کلرور مس	اکسی کلرور پرتونار	۳۵%	SC	پرتونار ویمال هند	سفیدک کرکی	خیار	۳-۷ روز	۳/۵ در هزار	۱۴۰۰/۶/۲۰
۱۷	اکسی کلرور مس	کیمیا کوپر اکسی	۳۵%	SC	کاوش کیمیای کرمان شیام کمیکالز	سفیدک کرکی	خیار	۳-۷ روز	۳/۵ در هزار	۱۴۰۰/۶/۱

۱۸	اکسی کلرور مس	فلیت	۵۰٪	WP	بصیر شیمی پارس ایزاگرو ایتالیا	گموز فایتوفترایی طوقه	مرکبات		۱۰۰ گرم در لیتر	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
						پوسیدگی ریشه				
۱۹	اکسی کلرور مس+ سیمو کسانیل	کوپروسیت سی	۴۳/۹۵٪	WP	دلتا پارس نهاده اگر یا	سفیدک داخلی	خیار	۵ روز	۳ کیلو گرم در هکتار	۹۴/۶/۲۳
۲۰	اکسی کلرور مس + مفنوکسام (متالاکسیل ام)	ریدومیل گلد آر	۱۶/۱۹٪	WG	سینجنتا	سفیدک کرکی	خیار	۳ روز	گلخانه ۶: در هزار	۱۴۰۰/۹/۲۹
									فضای باز: ۶ کیلوگرم در هکتار (دوبار سمپاشی در فصل زراعی به فاصله ۱۴ روز)	
۲۱	اکسید مس	ردشیلد	۴۵٪	WG	رها اندیش کاوان	آنتراکنوز	گردو	-	۲ در هزار	۹۹/۱۱/۶
۲۲	اکسید مس	نوردوکس	۷۵٪	WG	نوردوکس آ.اس نروژ	آتشک	درختان میوه دانه دار	۱۵ روز	۱ در هزار	۹۱/۶/۲۰
۲۳	اکسید مس	نوردوکس	۷۵٪	WG	نوردوکس آ.اس نروژ	پیچیدگی برگ	هلو	۱۵ روز	۲/۵ در هزار	۹۰/۴/۱۳
۲۴	اکسید مس	نوردوکس	۷۵٪	WG	نوردوکس آ.اس نروژ	سفیدک داخلی	سیب زمینی	۱۵ روز	۱ کیلوگرم در هکتار	۹۴/۷/۶
۲۵	اکسید مس	رد شیلد	۴۵٪	WG	رها اندیش کاوان Nordox	شانکر باکتریایی <i>Pseudomonas syringae</i>	درختان میوه هسته دار	۱۵ روز	۲ در هزار	۱۴۰۱/۵/۱۰

۲۶	اکسید مس	نوردوکس	۷۵٪	WG	نوردوکس آ.اس نروژ	پوسیدگی طوقه و ریشه	برنج	-	۱۳۰ گرم برای یکصد کیلوگرم بذر	۹۶/۴/۱۹
۲۷	اکسید مس (نوردوکس) ۲۵/۸٪+متالاکسیل ۶٪	نوردوکسیل	۳۱/۸٪	SC	Zhejiang Heben Pesticides and chemical	سفیدک داخلی	توتون	-	۱/۵ لیتر در هکتار (خزانة)	۱۴۰۰/۹/۲۹
									۲ لیتر در هکتار (مزرعه)	
۲۸	اکسی کلرور مس (دارای ۵۸/۳٪ مس)	کوپراکسی کلرید مس برزگر	۸۵٪	WP	برزگر برجسته Agro life Science corporation	پیچیدگی برگ	هلو	-	۴ در هزار	۱۴۰۰/۹/۱۵
۲۹	اکسی کلرور مس	کوپر پلاس	۵۰٪	WP	آرمان سبز آدینه شیام کمیکالز	سفیدک کرکی	گوجه فرنگی	۳ روز	۲ در هزار	۱۴۰۰/۴/۱۴
۳۰	آمتوکترا دین + دیمتومورف	اوروگو	۵۲/۵٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک داخلی	خیار (فضای باز و گلخانه)	۱ روز	۰/۷ در هزار استفاده بیش از دو نوبت متوالی و بیش از چهار نوبت در یک دوره تولید ممنوع است.	۹۷/۱۰/۱۷
۳۱	آمتوکترا دین + دیمتومورف	اوروگو	۵۲/۵٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک داخلی	هندوانه	۱ روز	۰/۷ در هزار در فواصل زمانی ۷-۱۰ روز جهت کنترل بیماری	۹۹/۲/۸
۳۲	آمتوکترا دین + دیمتومورف	اوروگو	۵۳/۵٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک داخلی	انگور	۱ روز	۱ در هزار، در فواصل زمانی ۷- ۱۰ روز جهت کنترل بیماری	۹۹/۴/۳۰

۳۳	پنفلوفن	امستوپرایم	۵٪	FS	بایر	شانکر ریزو کتونایی و شوره سیاه	سیب زمینی	۴۰۰ میلی لیتر برای ۱۰۰۰ کیلو گرم غده بذری به صورت ضد عفونی	۱۴۰۲/۴/۱۹
۳۴	پیری متانیل	میلیس	۳۰٪	SC	گیاه پر نیان اطلس Safa tarim	کپک خاکستری	توت فرنگی گلخانه	یک در هزار و در تناوب با سایر قارچ-کش ها و حداکثر دوبار در سال	۹۸/۱۱/۲۸
۳۵	پریمتانیل ۱۸۷/۲ گرم/لیتر + روغن میخک ۱۸۵ گرم/لیتر	زداتان ۲۰		EC	دانش میوه خاورمیانه Xeda فرانسه	کپک سبز	مرکبات	دو در هزار	۱۴۰۳/۳/۲۱
۳۶	پریمتانیل ۱۸۷/۲ گرم/لیتر + روغن میخک ۱۸۵ گرم/لیتر	زداتان ۲۰		EC	دانش میوه خاورمیانه Xeda فرانسه	پیشگیری کننده و درمان کننده		۲/۵ در هزار	۱۴۰۳/۱۱/۱۵
۳۷	پریمتانیل ۰/۱۴٪ + صمغ گیاهی کارنوبا ۱۹٪	مکسی فرش		واکس آماده مصرف	دانش میوه خاورمیانه پریمتانیل تولید شرکت xeda فرانسه	کپک سبز	مرکبات	۲ لیتر به ازای هر ۱۰۰۰ کیلو میوه	۱۴۰۳/۳/۲۱
۳۸	ایپرودیون	رورال	۵۰٪	WP	بایر آگ	شانکر ریزو کتونایی ساقه و شوره سیاه غده	سیب زمینی	۲٪ وزن غده	۸۶/۱۰/۱۰
۳۹	ایپرودیون ۱۷۵ + کاربندازیم ۸۵ (گرم /لیتر)	رست آپ	۲۶٪	SC	پاک سم ایرانیان jiangsu Lanfeng	شانکر ریزو کتونایی ساقه و شوره سیاه غده	سیب زمینی	۴ لیتر به ازای ۱۰۰۰ کیلو گرم غده بذری	۹۹/۴/۳۰
۴۰	ایزوپروتیولان	فوجی وان	۴۰٪	EC	مشکفام فارس نیپهون نوهیاکو	بلاست	برنج	۱/۲۵ لیتر در هکتار	۹۶/۳/۱

۴۱	ایمینو کتادین تریس	بلکیوت	۴۰٪	WP	نیپون سودا	سفیدک پودری	خیار	۱ روز	۰/۷۵-۰/۵ کیلوگرم در هکتار	۹۲/۴/۱۷
۴۲	ایمینو کتادین تریس	بلکیوت	۴۰٪	WP	نیپون سودا	لکه موجی (آلترناریا)	سیب زمینی	۷ روز	۷۵۰ گرم در هکتار	۹۳/۳/۱۲
۴۳	ایمینو کتادین تریس	بلکیوت	۴۰٪	WP	نیپون سودا	سفیدک پودری	انگور	۷ روز	۰/۷۵ در هزار	۹۵/۸/۲۴
۴۴	باسیلوس سوبتیلیس	کانگ می	۵٪	WP	گیاه پرنیان اطلس Deqiang Biology	بلاست	برنج	۲ روز	۱۸۰ گرم در هکتار	۹۷/۲/۲۴
۴۵	باسیلوس سوبتیلیس	کانگ می	۵٪	WP	گیاه پرنیان اطلس Deqiang Biology	لکه موجی آلترناریایی	گوجه فرنگی	-	۱/۲۵ در هزار	۱۴۰۱/۴/۲۰
۴۶	باسیلوس ولزنسیس	پارس باسیل	۱۰ ^۸	SC	رویوان تيسان	پژمردگی فوزاریوم	گوجه فرنگی گلخانه	ندارد	در سه مرحله به ترتیب با دزهای ۵،۵ و ۴ لیتر در هکتار	۹۸/۸/۲۷
۴۷	باسیلوس سوبتیلیس <i>Bacillus subtilis</i>	سرناد	۱۰ ^{۱۲}	SC	بایر آلمان	کپک خاکستری	توت فرنگی گلخانه	ندارد	۵ در هزار	۹۸/۱۰/۹
۴۸	باسیلوس سوبتیلیس <i>Bacillus subtilis</i>	سرناد	۱۰ ^{۱۲}	SC	بایر آلمان	پژمردگی فوزاریومی	گوجه فرنگی گلخانه	ندارد	۱۰ لیتر در هکتار به روش خیساندن خاک پس از انتقال نشاء	۱۴۰۰/۹/۲۲

۴۹	باسیلوس سوبتیلیس	روبین ۱	۱۰ ^۷	پودر مرطوب	زیست فناوری سبز	پوسیدگی ریزوکتونایی ریشه	چغندر قند	ندارد	۲۰۰ گرم در هکتار، ۴۵ و ۹۰ روز پس از کاشت	۹۹/۴/۳۰
۵۰	مخلوط بردو	میشو بردوکس	۱۸٪	SC	سبزآور پردیس	بیماری غربالی	زردآلو	۷ روز	۱۰ در هزار دو مرحله	۹۳/۱۲/۴
۵۱	مخلوط بردو	بردو کیمیا	۱۸٪	SC	کاوش کیمیا کرمان	شانکر سیتوسپرای	درخت سیب	۷ روز	۲ درصد محلول پاشی توأم با پانسمان شانکر با بردو کیمیا ۸ درصد	۹۴/۱۰/۷
۵۲	مخلوط بردو	بردو بهسم	۱۸٪	SC	البرز بهسم	غربالی	زردآلو	۷ روز	۱۰ در هزار	۹۶/۱۱/۱۶
	ماده موثره سولفات مس و هیدروکسید کلسیم									
۵۳	مخلوط بردو	بردوسیف	۱۸٪	SC	سبزآور نگین فلات	آتشک	درختان میوه دانه دار	۷ روز	۸ در هزار در مرحله جوانه و ۵ در هزار در مرحله ۵ درصد، ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد گل	۹۶/۲/۲۵
۵۴	مخلوط بردو	بردوسیف	۱۸٪	SC	سبزآور نگین فلات	سفیدک داخلی	خیار(گلخانه)	-	۵ در هزار	۹۷/۹/۲۶
۵۵	مخلوط بردو	بردوسیف	۱۸٪	SC	سبزآور نگین فلات	پیچیدگی برگ	هلو	-	۸ در هزار	۹۸/۳/۳۷
۵۶	مخلوط بردو	بردو سمیران	۲۰٪	SC	سمیران	پیچیدگی برگ	هلو	۷ روز	۸-۵ در هزار در زمان ریزش برگ-ها در پاییز و تورم جوانه-ها در بهار	۹۶/۳/۱
۵۷	مخلوط بردو	بردوکسین	۲۰٪	SC	اکسین شیمی آدان	سفیدک داخلی	خیار(گلخانه)	-	۵ در هزار	۹۷/۹/۲۶
۵۸	مخلوط بردو	بردوتکس	۲۰٪	SC	پرتونار	سفیدک داخلی	خیار(گلخانه)	-	۵ در هزار	۹۷/۹/۲۶

۹۸/۳/۲۷	۹ در هزار	-	هلو	پیچیدگی برگ	پرتونار	SC	۲۰٪	بردوتکس	مخلوط بردو	۵۹
۹۷/۳/۲۸	۵ در هزار	۷ روز	گوجه فرنگی	سفیدک داخلی	باغبان تاک	SC	۱۸٪	بردوفیکس	مخلوط بردو	۶۰
۹۷/۸/۱۴	۱۰ در هزار در مرحله جوانه و ۴ در هزار در مرحله ۵، ۵۰ و ۱۰۰ درصد گل	۷ روز	دانه دار	آتشک درختان میوه	باغبان تاک	SC	۱۸٪	بردوفیکس	مخلوط بردو	۶۱
۹۸/۳/۲۷	۲/۵ در هزار	-	انگور	سفیدک پودری	باغبان تاک	SC	۸۰٪	سولفیکس	مخلوط بردو	۶۲
۹۸/۳/۲۷	۱۰ در هزار	-	هلو	پیچیدگی برگ	باغبان تاک	SC	۱۸٪	بردوفیکس	مخلوط بردو	۶۳
۹۷/۹/۲۶	۵ در هزار	-	خیار(گلخانه)	سفیدک داخلی	باغبان تاک	SC	۱۸٪	بردوفیکس	مخلوط بردو	۶۴
۹۷/۱۲/۱۳	۹ در هزار	-	زردالو	غربالی	گیاه	SC	۲۰٪	بردوجی	مخلوط بردو	۶۵
۹۹/۴/۳۰	۱۵ در هزار	-	زردالو	غربالی	فراورده های طیف سبز	SC	۱۸٪	بردوطیف	مخلوط بردو	۶۶
۱۴۰۰/۹/۱۵	۵ لیتر در هکتار	۳ روز	سیب زمینی	سفیدک کرکی	خزرم کود مانیکا ایتالیا	SC	۱۰٪	MANIFLOW	مخلوط بردو	۶۷
۱۴۰۳/۶/۲۶	۶ در هزار	-	درختان میوه هسته دار	شانکر باکتریایی	گیاه	WP	۲۴٪		مخلوط بردو	۶۸

۶۹	مخلوط بردو ۱۵٪ (CU) + فوزتیل آلومینیوم ۱۸٪	توتور	۳۳٪	WP	خزرسم کود مانیکا ایتالیا	سفیدک کرکی	خیار	۷ روز	۳ کیلوگرم در هکتار در تناوب با سایر قارچ کش های ثبت شده	۹۹/۶/۲۴
۷۰	بوسکالید ۲۵/۲٪ + پیراکلواستروبین ۱۲/۸٪	یونیلیس	۳۸٪	WG	بازرگانان سرای سپند پارس Shandong Kangqiao	سفیدک پودری	گوجه فرنگی	-	یک در هزار (حداکثر دو بار در سال)	۹۸/۱۰/۲۳
۷۱	بوسکالید + پیراکلواستروبین	بلیس	۳۸٪	WG	ب آ اس اف	سفیدک پودری	هلو - شلیل	۷ روز	۰/۷ در هزار مناطق خشک، ۱ در هزار مناطق مرطوب	۸۹/۹/۲۹
۷۲	بوسکالید + پیراکلواستروبین	بلیس	۳۸٪	WG	ب آ اس اف	سفیدک پودری	سیب درختی	-	۰/۷ در هزار و در تناوب با سایر قارچکش-ها و حداکثر دوبار در سال	۹۷/۱۲/۱۳
۷۳	بوسکالید + پیراکلواستروبین	سیگنوم	۳۳/۴٪	WG	ب آ اس اف	آلترناریا	گوجه فرنگی	۳ روز	۰/۵ کیلوگرم در هکتار	۹۴/۱۲/۱۰
۷۴	بوسکالید + پیراکلواستروبین	سیگنوم	۳۳/۴٪	WG	ب آ اس اف	آلترناریا	سیب زمینی	۳ روز	۰/۵ کیلوگرم در هکتار	۹۵/۳/۱۷
۷۵	بوسکالید + پیراکلواستروبین	سیگنوم	۳۴/۴٪	WG	ب آ اس اف	کپک خاکستری	توت فرنگی گلخانه	۳ روز	۱/۵ در هزار و در تناوب با سایر قارچ-کش-ها و حداکثر دوبار در سال	۹۸/۱۱/۲۸
۷۶	بوسکالید + پیراکلواستروبین	سیگنوم	۳۳/۴٪	WG	ب آ اس اف	افتادگی برگ	کاهو	۳ روز	۱/۵ کیلو گرم در هکتار حداکثر دو مرحله و با رعایت فاصله ۱۴	۹۹/۳/۱۲
۷۷	بوسکالید + پیراکلواستروبین	سیگنوم	۳۳/۴٪	WG	ب آ اس اف	کپک خاکستری	خیار	۳ روز	۱/۲۵ در هزار	۱۴۰۰/۷/۲۶
۷۸	بوسکالید ۲۶۷ گرم/کیلوگرم + پیراکلواستروبین ۶۷ گرم/کیلوگرم	سیگنوم	۳۳/۴٪	WG	ب آ اس اف	سوختگی استمفیلیومی برگ	سیر	۳ روز	۱۲۰۰ گرم در هکتار	۱۴۰۳/۴/۱۱

۷۹	بوسکالید ۲۶۷ گرم/کیلوگرم+ پیراکلوستروبین ۶۷ گرم/کیلوگرم	سیکنوم	۳۳/۴٪	WG	ب آ اس اف	کپک خاکستری	لفل گلخانه ای	۳ روز	۱ در هزار	۱۴۰۳/۷/۱۶
۸۰	بوسکالید+ کرزوکسیم متیل	کولیس	۳۰٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	هلو- شلیل	۷ روز	۰/۵ در هزار	۸۹/۹/۲۹
۸۱	بوسکالید+ کرزوکسیم متیل	کولیس	۳۰٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	خیار	-	۰/۴ در هزار	۹۶/۹/۱۳
۸۲	بوسکالید+ کرزوکسیم متیل	کولیس	۳۰٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	گوجه فرنگی (فضای باز)	-	۰/۵ در هزار	۹۸/۴/۱۰
۸۳	بی کرنات پتاسیم	کالیان	۸۵٪	SP	کیمیا سبز آور	سفیدک پودری	جالیز- گلخانه	-	۵ در هزار	۹۰/۱۲/۱
۸۴	پایدیفلومتوفن ۷۵ (آپیدین) گرم/کیلوگرم+دیفنوکونازول ۱۲۵ گرم/کیلوگرم	میراویس دیوو	۲۰٪	SC	سینجنتا	سفیدک پودری	انگور	-	۰/۷ در هزار	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۸۵	پایدیفلومتوفن ۷۵ (آپیدین) گرم/کیلوگرم+دیفنوکونازول ۱۲۵ گرم/کیلوگرم	میراویس دیوو	۲۰٪	SC	سینجنتا	سفیدک پودری	سیب	-	۰/۸ در هزار	۱۴۰۲/۵/۳۰
۸۶	پراستیک اسید+پراکسید هیدروژن	فورمایسین گلد پی ایکس	۲۰٪	SL	پاک گستر پرند	سیاهک پنهان (ضد عفونی بذور)	گندم		دو در هزار	۱۴۰۳/۵/۱
۸۷	پروپیکونازول	بهتیل	۲۵٪	EC	بهاور شیمی آستک	زنگ زرد	گندم	-	یک لیتر در هکتار	۹۷/۱۲/۱۳
۸۸	پروپیکونازول ۱۵ درصد+ دیفنوکونازول ۱۵ درصد	هاربور	۳۰٪	EC	گیاه پر نیان اطلس Safa tarim	سپتوریوز	گندم	۲۱	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۹/۶/۲۴

۸۹	پروتیو کونازول + تبو کونازول	لاماردور	۴۰٪	FS	بایر آگ	سیاهک پنهان معمولی	گندم	-	۱۰-۱۵ میلی لیتر برای یکصد کیلو گرم بذر	۸۹/۳/۱۰
۹۰	پروتیو کونازول + تبو کونازول	لاماردور	۴۰٪	FS	بایر آگ	سیاهک آشکار	گندم	-	۲۰ میلی لیتر برای یکصد کیلو گرم بذر	۸۹/۹/۱
۹۱	پروتیو کونازول + تبو کونازول	لاماردور	۴۰٪	FS	بایر آگ	سیاهک آشکار	جو	-	۱۵ میلی لیتر برای یکصد کیلو گرم بذر	۹۶/۴/۱۹
۹۲	پروتیو کونازول گرم /لیتر ۱۵۰ + تبو کونازول ۲۰ گرم /لیتر	ردیگو پرو	۱۷٪	FS	بایر آگ	سیاهک پنهان معمولی	گندم	-	نیم در هزار	۱۴۰۳/۲/۳
۹۳	پروپامو کارب هیدرو کلراید و فوزتیل آلومینیوم	پرویکورانرژ	۸۴٪	SL	بایر آگ	بوته میری	خیار	۳ روز	۳ لیتر در هکتار در مزرعه به صورت شنی در گلخانه به منظور ضد عفونی خاک جهت کنترل عامل بیماری فوق به مقدار ۰/۳ لیتر در هر متر مکعب خاک به صورت مخلوط با خاک	۹۲/۷/۸
۹۴	پروپامو کاب هیدرو کلراید + فلوپیکولید	اینفینیتو	۶۸/۷۵٪	SC	بایر آگ	سفیدک داخلی	خیار- گلخانه	۱ روز	۲ در هزار	۹۲/۸/۷
۹۵	پروپامو کاب هیدرو کلراید + فلوپیکولید	اینفینیتو	۶۸/۷۵٪	SC	بایر آگ	سفیدک داخلی	سیب زمینی	۷ روز	۱/۲ لیتر در هکتار	۹۴/۷/۶

۹۴/۷/۶	۲/۵ لیتر در هکتار	-	سیب زمینی	سفیدک داخلی	بازرگان کالا Arysta life science	SC	۴۵٪	پروکسانیل	پروپامو کارب هیدروکلراید+ سیموکسانیل	۹۶
۱۴۰۰/۹/۲۹	۲ در هزار	۳-۷ روز	خیار	سفیدک داخلی	دلتا پارس نهاده آگريا	SC	۴۵٪	ریوالدو	پروپامو کارب هیدروکلراید+ سیموکسانیل	۹۷
	۲ لیتر در هکتار در فضای باز									
۱۴۰۳/۹/۵	۲ لیتر در هکتار و حداکثر دو بار محلول پاشی	۷ روز	گوجه فرنگی	سفیدک داخلی	دلتا پارس نهاده آگريا	SC	۴۵٪	ریوالدو	پروپامو کارب هیدروکلراید+ ۴۰۰ گرم/لیتر+ سیموکسانیل	۹۸
۹۶/۱۱/۳۰	۱ در هزار در زمان کشت بذر و انتقال نشا و ۰/۷۵ در هزار دو هفته پس از انتقال نشا	-	خیار	بوته میری <i>Pythium aphanidermatum</i>	بازرگان کالا Arysta life science	SL	۷۲/۲٪	پروپلنت	پروپامو کارب هیدروکلراید	۹۹
۹۷/۱۲/۱۳	نیم لیتر در هکتار	-	گندم	زنگ زرد	ب آ اس اف	EC	۳۵/۵٪	اینور	پروپیکونازول+فلوکسازول+پیراکلوآستروبین	۱۰۰
۹۲/۸/۲۷	۰/۹ گرم در هر متر مربع	-	قارچ خوراکی	پوسیدگی خشک	فرتی اگرو	WP	۵۰٪	آکورد	پروکلراز	۱۰۱
۹۹/۴/۳۰	۱-۱/۲۵ در هزار (ضد عفونی بذر)	-	سیب زمینی	شانکر ریزوکتونیایی	بایراگ	FS	۲۵٪	مونسرن	پنسیکرون	۱۰۲
۱۴۰۳/۳/۲۱	۱۰۰۰ میلی لیتر در هکتار	۳۵ روز	برنج	بلاست	BASF	CS	۱۰٪	سلتیما	پیراکلوآستروبین	۱۰۳

۱۰۴	پیراکلواستروبین + دیمتومورف	پیرادیم	۱۸/۷٪	DF	Jiangsu Greenscie Chemical	برزرگر برجسته	سفیدک داخلی	خیار(گلخانه)	-	۰/۳۵ در هزار(بیش از سه نوبت متوالی و بیش از شش نوبت در یک دوره تولید ممنوع است).	۹۷/۱۰/۱۷
۱۰۵	پیراکلواستروبین + دیمتومورف	پیرادیم	۱۸/۷٪	DF	Jiangsu Greenscie Chemical	برزرگر برجسته	سوختگی الترناریایی	پسته	-	۰/۷۵ در هزار	۱۴۰۱/۴/۲۰
۱۰۶	پیراکلواستروبین + فلوکسایپروکساد	پریاکسور	۲۲/۵٪	EC	ب آ اس اف		سفیدک پودری	گندم	-	۱/۵ لیتر در هکتار	۹۹/۳/۱۲
۱۰۷	<i>Pythium Oligandrum</i> Drechsler	پلی ورسوم		WP	بازارگان کالا Biopreparaly	عامل پیشگیرانه بیماری گیاهچه میری	خیار گلخانه	-	-	۰/۳-۰/۴ در هزار در طول فصل رویش همراه با آب آبیاری دوبار در فصل کاشت	۱۴۰۰/۹/۱۵
۱۰۸	تالارومیسس فلاووس	تالارومین	۱۰ ^۹		ذرات جامد قابل انتشار در آب	بهاران دشت ساحل	پژمردگی ورتیسیلیومی	سیب زمینی	ندارد	۶۰ کیلوگرم برای بذرمال کردن ۴ تن غده سیب زمینی در هکتار	۹۷/۲/۳۰
۱۰۹	تبوکونازول	فولیکور	۲۵٪	EW	بایر آگ	پوسیدگی اسکلروتینیایی	ساقه کلزا	-	-	۱ لیتر در هکتار	۹۴/۳/۱۱
۱۱۰	تبوکونازول	آرتمیس	۶٪	FS	بیستر فیلد	سیاهک پنهان معمولی	گندم	-	-	۵۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	۹۵/۹/۲۹
۱۱۱	تبوکونازول	تبوکور	۲۵٪	EW	گل سم گرگان نینگ بوسانجوی	زنگ زرد	گندم	-	-	یک لیتر در هکتار	۹۷/۱۲/۱۳

۱۱۲	تبوکونازول	تایدتیو	۴۰٪	SC	گیاه پرنیان اطلس تاید کراپ-ساینس	زنگ زرد	گندم	-	۰/۴ لیتر در هکتار	۹۷/۱۲/۱۳
۱۱۳	تتراکونازول	لوسپل	۱۲/۵٪	LS	ایزاگرو	سیاهک آشکار سیاهک پنهان	گندم	-	۱۰۰ میلی لیتر برای ضد عفونی یکصد کیلوگرم بذر ۳۰ میلی لیتر برای ضد عفونی یکصد کیلوگرم بذر	۸۹/۱۰/۱۳
۱۱۴	تبوکونازول + آزوکسی استروبین	آذیلون	۳۲٪	SC	آریاشیمی Ningbo + Sunjoy Jiangsu	سفیدک پودری	رز	-	یک در هزار	۹۸/۱۰/۲۳
۱۱۵	تتراکونازول + آزوکسی استروبین	افیانس	۱۸٪	SC	بازرگان کالا Isagro	سفیدک پودری	هلو	-	۰/۶ در هزار	۱۴۰۱/۴/۲۰
۱۱۶	تتراکونازول + آزوکسی استروبین	افیانس	۱۸٪	SC	بازرگان کالا Isagro	لکه موجی	گوجه فرنگی	۳ روز	۶۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۲/۳/۲۹
۱۱۷	تبوکونازول + پیراکلواستروبین	پیلار تب	۳۰٪ (۳۴۵ گرم/لیتر)	SC	ساعی گل تهران Jiangsu Mindleader crop science	سفیدک پودری	گندم	-	۶ دهم لیتر در هکتار	۱۴۰۰/۹/۱
۱۱۸	تتراکونازول	دومارک	۱۰٪	EC	ایزاگرو	سفیدک پودری	جالیز	۳ روز	۰/۵ لیتر در هکتار در مزرعه	۸۸/۸/۱۱
									۰/۴ در هزار در گلخانه	
۱۱۹	تتراکونازول	دومارک	۱۰٪	EC	ایزاگرو	سفیدک پودری	سیب	۱۴ روز	۰/۳ در هزار	۹۲/۳/۲۷

۱۲۰	تتراکونازول	امی نت	۱۲/۵٪	ME	ایزاگرو	سفیدک پودری	چغندر قند	۲۱ روز	۰/۸-۱ لیتر در هکتار	۹۰/۷/۴
۱۲۱	تریادیمنول	بایتان	۷/۵٪	DS	بایر آگ	سیاهک آشکار	جو	-	۱۵۰ گرم برای یکصد کیلوگرم بذر	۸۹/۳/۱۰
۱۲۲	تری تیکونازول	رنال	۲۰٪	FS	ب آ اس اف	سیاهک آشکار	جو	-	۲۰ میلی لیتر برای ضد عفونی یکصد کیلوگرم بذر	۸۹/۳/۱۰
۱۲۳	تری فلوکسی استروبین	فلینت	۵۰٪	WG	بایر آگ	سفیدک پودری	جالیز- مزرعه	۱ روز	۲۰۰ گرم در هکتار	۸۸/۸/۱۱
۱۲۴	تری فلوکسی استروبین	فلینت	۵۰٪	WG	بایر آگ	سفیدک پودری	گوجه فرنگی- مزرعه	۱ روز	۲۵۰ گرم در هکتار	۹۶/۵/۲
۱۲۵	تری فلوکسی استروبین ۱۴٪+بوسکالید۴۲٪		۵۶٪	SC	ناردان توسعه یزد	سفیدک پودری	انگور	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۱۴۰۳/۵/۲۲
۱۲۶	تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول	ناتیوو	۷۵٪	WG	بایر آگ	بلاست	برنج	۲۱ روز	۱۶۰ گرم در هکتار	۹۲/۳/۶
۱۲۷	تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول	ناتیوو	۷۵٪	WG	بایر آگ	لکه سیاه	سیب	۱۴ روز	۰/۲-۰/۳ در هزار	۹۴/۵/۱۲
۱۲۸	تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول	ناتیوو	۷۵٪	WG	بایر آگ	سفیدک پودری	سیب	۱۴ روز	۰/۳ در هزار	۹۵/۶/۱
۱۲۹	تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول	ناتیوو	۷۵٪	WG	بایر آگ	سفیدک پودری	چغندر قند	-	۲۰۰ گرم در هکتار	۹۵/۶/۱
۱۳۰	تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول	ناتیوو	۷۵٪	WG	بایر آگ	شیت بلایت	برنج	۲۱ روز	۱۶۰ گرم در هکتار	۹۶/۹/۱۳
۱۳۱	تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول	فلونازول	۷۵٪	WG	بازرگانان سرای سپند پارس CAC Nantong	بلاست	برنج	۲۱ روز	۱۶۰ گرم در هکتار	۹۸/۱۱/۱۴

۹۸/۱۱/۱۴	۳۲۰ میلی لیتر در هکتار	-	برنج	بلاست	پاک سم ایرانیان &sunjoy CAC Nanton	SC	۳۷/۵٪	تیلما	تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول	۱۳۲
۹۸/۱۱/۱۴	۱۶۰ گرم در هکتار	-	برنج	بلاست	گل سم گرگان &sunjoy CAC Nanton	WG	۷۵٪	ایوت	تری فلوکسی استروبین ۵۰٪ + تبوکونازول ۲۵٪	۱۳۳
۹۶/۲/۲۵	۰/۲ در هزار	۱۴ روز	سیب	سفیدک پودری	بایر آگ	SC	۵۰٪	لونا سن سیشن	تری فلوکسی استروبین + فلوپیرام	۱۳۴
۹۶/۳/۱	۰/۲ در هزار	۱۴ روز	سیب	لکه سیاه	بایر آگ	SC	۵۰٪	لونا سن سیشن	تری فلوکسی استروبین + فلوپیرام	۱۳۵
۹۶/۳/۱	۰/۲ در هزار	۳ روز	خیار-گلخانه	سفیدک پودری	بایر آگ	SC	۵۰٪	لونا سن سیشن	تری فلوکسی استروبین + فلوپیرام	۱۳۶
۹۶/۵/۲	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۵ روز	گوجه فرنگی- مزرعه	سفیدک پودری	بایر آگ	SC	۵۰٪	لونا سن سیشن	تری فلوکسی استروبین + فلوپیرام	۱۳۷
۱۴۰۰/۷/۲۶	۴ دهم در هزار	-	خیار	کپک خاکستری	بایر آگ	SC	۵۰٪	لونا سن سیشن	تری فلوکسی استروبین + فلوپیرام	۱۳۸
۹۹/۱۰/۹	یک در هزار	-	درختان سیب	سفیدک پودری	رهااندیش کاوان نپون سودا	EC	۱۵٪	تریفمین	تری فلوپیرام	۱۳۹
۹۹/۱۰/۱	۷۵ / ۰ در هزار	۱۴ روز	هلو	سفیدک پودری	رهااندیش کاوان نپون سودا	WG	۱۸/۴٪	پانچو تی اف	تری فلوپیرام + سایفلوفنامید	۱۴۰

۱۴۱	تری فلومیزول + سایفلوفنامید	پانچو تی اف	۱۸/۴%	WG	رهاندیش کاوان نیون سودا	مومیایی	هلو	۱۵ روز	۷۵ / ۰ در هزار	۱۴۰۰/۴/۱۴
۱۴۲	تریفورین	ساپرول	۱۹%	DC	سومیتومو	لکه آجری	بادام	-	۰/۳ در هزار	۹۶/۱۱/۳۰
۱۴۳	تریتیو کونازول + پیراکلواستروبین	اینشورپر فرم	۱۲%	FS	ب آ اس اف	سیاهک پنهان معمولی	گندم	-	۰/۵ - ۰/۴ در هزار	۹۸/۱۲/۲۸
۱۴۴	تریتیو کونازول + پیراکلواستروبین	اینشورپر فرم	۱۲%	FS	ب آ اس اف	سیاهک آشکار	گندم	-	۰/۵ در هزار	۱۴۰۰/۹/۱
۱۴۵	تیفلوزامید	آچمز	۲۴%	SC	گروه شهر سبز و سلامت پارسیان Shandong kangqiao	سوختگی غلاف برگ برنج(شیت بلایت)	برنج	۲۱ روز	۳۰۰ سی سی در هکتار در تناوب با سایر قارچ کش ها	۹۹/۳/۲۶
۱۴۶	تیوفانات متیل + تری سیکلازول	ویستا	۷۲/۵%	WP	نیون سودا ژاپن	بلاست برگ و خوشه	برنج	۲۱ روز	۰/۵ - ۰/۴ کیلوگرم در هکتار	۹۰/۳/۳۰
۱۴۷	تری کودرما هارزیانوم	تریانوم پی	۱۰ ^۹	WP	گیاه کوپرت هلند	پژمردگی فوزاریومی	گوجه فرنگی گلخانه	ندارد	۳۰-۴۰ گرم برای هزار گیاه	۹۱/۲/۹

۱۴۸	تری کودرما هارزیانوم	تریانوم پی	۱۰ ^۹	WP	گیاه کوپرت هلند	پژمردگی فوزاریومی	خیار گلخانه	ندارد	۳۰-۴۰ گرم برای هزار گیاه	۹۱/۲/۹
۱۴۹	تری کودرما هارزیانوم	تریانوم جی	۱۰ ^۹	G	گیاه کوپرت هلند	پژمردگی فوزاریومی	طالبی	ندارد	۱۵-۲۰ کیلوگرم در هکتار	۹۷/۹/۲۱
۱۵۰	تری کودرما هارزیانوم	تریانوم جی	۱۰ ^۸	G	گیاه کوپرت هلند	پژمردگی فوزاریومی	گوجه فرنگی گلخانه	ندارد	۲۵۰-۳۷۵ گرم در متر مکعب	۹۷/۹/۲۱
۱۵۱	سه جدایه موتانت تری کودرما	-	۱۰ ^۸	WP	پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای	پوسیدگی زغالی	سویا		۱/۵ کیلوگرم با ۳۰۰ لیتر آب در هکتار	۱۴۰۳/۳/۲۱
۱۵۲	دیتیانون	دلان	۵۰٪	SC	ب آ اس اف	لکه سیاه	سیب	۴۵ روز	۰/۷۵ در هزار	۱۴۰۲/۵/۳۰
۱۵۳	دیفنو کونازول + سایپرو کونازول	دیویدند استار	۳/۶۳٪	FS	سینجنتا	سیاهک آشکار	جو	-	۲۰۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	۸۹/۳/۱۰
۱۵۴	دیفنو کونازول + سایپرو کونازول	دیویدند استار	۳/۶۳٪	FS	سینجنتا	سیاهک آشکار	گندم	-	۱۰۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	۸۹/۹/۱
۱۵۵	دیفنو کونازول + سیفلوفنامید	سیدلی تاپ	۱۴٪	DC	سینجنتا	سفیدک پودری	خیار در شرایط گلخانه ای	-	۱ در هزار (عدم کاربرد بیش از دو نوبت در طول یک فصل)	۹۷/۸/۱۴
۱۵۶	دیفنو کونازول ۱۲۵ گرم/لیتر + سیفلوفنامید ۱۵ گرم/لیتر	سیدلی تاپ	۱۴٪	DC	سینجنتا	سوختگی استمفیلیومی برگ	سیر	۱۵ روز	۱۰۰۰ میلی لیتر در هکتار با فاصله ۷-۱۰ روز به صورت متناوب	۱۴۰۳/۴/۱۱
۱۵۷	دیفنو کونازول + فلوکسایپروکسادی (xemium)	داگونیس	۱۲/۵٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	خیار گلخانه ای	۳ روز	۰/۵ در هزار	۹۹/۱۰/۲۲
۱۵۸	دیفنو کونازول + فلوکسایپروکسادی (xemium)	داگونیس	۱۲/۵٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	سیب	۳ روز	۰/۶ در هزار	۱۴۰۰/۹/۲۲

۱۵۹	دیفنو کونازول + فلوکسایپروکساد (xemium)	داگونیس	۱۲/۵٪	SC	ب آ اس اف	لکه سیاه سیب	سیب	-	۰/۶ در هزار	۱۴۰۰/۱۲/۹
۱۶۰	دیفنو کونازول + فلوکسایپروکساد (xemium)	داگونیس	۱۲/۵٪	SC	ب آ اس اف	لکه موجی	سیب زمینی	۷ روز	۷۵۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۷/۲۵
۱۶۱	دیفنو کونازول + فلوکسایپروکساد (xemium)	داگونیس	۱۲/۵٪	SC	ب آ اس اف	لکه موجی	گوجه فرنگی	۳ روز	۱۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۲/۳/۲۹
۱۶۲	دیفنو کونازول ۵۰ گرم/لیتر + فلوکسایپروکساد ۷۵ گرم/لیتر (xemium)	داگونیس	۱۲/۵٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	توت فرنگی		۰/۶ در هزار	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۱۶۳	دیفنو کونازول ۵۰ گرم/لیتر + فلوکسایپروکساد ۷۵ گرم/لیتر	داگونیس	۱۲/۵٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	گوجه فرنگی	۳ روز	۶۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۳/۴/۱۱
۱۶۴	دیمتومورف + پیراکلوستروبین	کابریو دو	۱۱/۲٪	EC	ب آ اس اف	آلترناریا	گوجه فرنگی	۳ روز	۲ لیتر در هکتار	۹۴/۱۲/۱۰
۱۶۵	دیمتومورف + مانکوزب	آکروبات ام زد	۶۹٪	WG	ب آ اس اف	سفیدک داخلی	سیب زمینی	۷ روز	۲ کیلوگرم در هکتار	۹۴/۸/۲۵
۱۶۶	سایپروکونازول + کاربندازیم	آلتو کمی	۴۲٪	SC	سینجنتا	پوسیدگی اسکلروتنیایی	ساقه کلزا	-	۱ لیتر در هکتار	۹۴/۳/۱۱
۱۶۷	سیازوفامید	رانمن	۴۰٪	SC	ایشیهارا	سفیدک داخلی	خیار- گلخانه	۳ روز	۰/۴-۰/۵ در هزار	۹۱/۳/۸
۱۶۸	سیازوفامید	رانمن	۴۰٪	SC	ایشیهارا	بازدگی	سیب زمینی	-	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	۹۴/۷/۶
۱۶۹	سیازوفامید	رانمن	۱۰٪	SC	ایشیهارا	سفیدک داخلی	خیار- گلخانه	۳ روز	۱/۵ در هزار	۹۶/۵/۲

۱۷۰	سیازوفامید	رگنات	۲۰٪	SC	بازرگانان سرای سپند پارس شاندوگ هایلر	سفیدک داخلی	خیار(گلخانه)	-	۰/۶ در هزار(بیش از سه نوبت متوالی و بیش از شش نوبت در یک دوره تولید ممنوع است).	۹۷/۱۰/۱۷
۱۷۱	سولفور	سولفولاک	۸۰٪	WG	بیسترفیلد	سفیدک پودری	خیار	۱ روز	۳ کیلوگرم در هکتار	۹۲/۴/۱۷
۱۷۲	سولفور	گوگرد سمیران	۸۰٪	SC	سمیران	سفیدک پودری	انگور	-	۲/۵ در هزار	۹۲/۸/۲۷
۱۷۳	سولفور	سولفور ارکیده سازان	۴۰٪	SC	ارکیده سازان	سفیدک پودری	شلیل	۲۰ روز	۳/۷۵ در هزار	۹۳/۶/۱۰
۱۷۴	سوافور	پارومی دی	۸۰٪	DF	آریا شیمی کروماندل	سفیدک پودری	خیار گلخانه	-	۳ در هزار با مشاهده اولین علائم و در تناوب با سایر قارچ کش ها	۹۹/۳/۲۶
۱۷۵	سیپرودینیل	سیپرودین	۵۰٪	WG	آتیه نگین فلات Shaanxi hengrun chemical industry	پوسیدگی خاکستری	انگور	۱۴ روز	۱ در هزار	۱۴۰۱/۱۱/۳
۱۷۶	سیپرودینیل+فلودیوکسانیل	سویچ	۶۲/۵٪	WG	سینجنتا	نکروز ساقه	گوچه فرنگی	۳ روز	۱ در هزار	۱۴۰۲/۵/۹
۱۷۷	سیپرودینیل+فلودیوکسانیل	سویچ	۶۲/۵٪	WG	سینجنتا	کپک خاکستری	توت فرنگی	۳ روز	۰/۸ در هزار	۱۴۰۲/۵/۹

۱۷۸	سیپرودینیل ۳۷.۵٪+فلودیوکسانیل ۲۵٪	سویچ	۶۲/۵٪	WG	سینجنتا	کپک خاکستری	خیار	۷ روز	۱ در هزار	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۱۷۹	سولفات مس ۱۰۲+ فسفیت پتاسیم ۵۱۹	سراکوئینت	۶۲/۲٪	SP	دھروان رویش سبز Ceradis Crop Protection	کپک خاکستری	توت فرنگی	بدون کارنس	۳ در هزار	۹۸/۱۰/۹
۱۸۰	سیمو کسانیل ۶۰ گرم/کیلوگرم +هیدروکسید مس ۴۶۱ گرم/کیلوگرم	کوپفورس اکسترا		WG	دلتا پارس نهاده Zenith Crop Sciences Bulgaria	سفیدک کرکی	انگور	۲۱ روز	۲ در هزار	۱۴۰۳/۱۰/۳
۱۸۱	فاموکسادون + سیمو کسانیل	اکولایزر	۵۲/۵٪	WG	خزر سم کود Zhejiang Sega	سفیدک داخلی	پیاز	-	۰/۴ کیلوگرم در هکتار (مزرعه)	۹۷/۱۲/۱۳
۱۸۲	فاموکسادون + سیمو کسانیل	زرین پرو	۵۲/۵٪	WG	زرین خوشه جنوب Shanghai Shengnong	سفیدک کرکی	سیب زمینی	۱۴ روز	۴۰۰ گرم در هکتار	۹۹/۶/۲۴
۱۸۳	فاموکسادون ۲۲/۵٪+ سیمو کسانیل ۳۰٪	اسپیدول (Spidoll)	۵۲/۵٪	WG	دلتا پارس نهاده Astranova	لکه برگی آلترناریایی	هندوانه	۷ روز	۴۰۰ گرم در هکتار	۱۴۰۳/۹/۱۹
۱۸۴	فلوتیانیل	گاتن	۵٪	EC	الیت ساوان OAT AGRO	سفیدک پودری	انگور	۱۴ روز	۲/۵ در هزار	۹۹/۴/۹
۱۸۵	فناماکریل	لیانگدی	۲۵٪	SC	کیمیا سبزینه پویا جیانگ سو	فوزاریوم	سنبله گندم	-	۳ لیتر در هکتار (در تناوب با قارچ کش های رایج)	۹۷/۱۰/۱۷

۱۸۶	فلودیکسانیل	سلسنت	۱۰٪	FS	سینجنتا	شانکر ریزوکتونایی <i>Rhizoctonia solani</i>	سیب زمینی		۲۵۰ میلی لیتر به ازای ۱۰۰۰ کیلوگرم غده بذری	۱۴۰۱/۵/۱۰
۱۸۷	فلوکساپیروکساد	سرکادیس	۳۰٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	هلو	۲۱ روز	۰/۱۵ در هزار	۱۴۰۰/۴/۲۸
۱۸۸	فلوکساپیروکساد	سرکادیس	۳۰٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	انگور	۲۱ روز	۰/۱۵ در هزار	۱۴۰۰/۹/۱
۱۸۹	فوزتیل آلومینیوم	الیت	۸۰٪	WG	شاندونگ داچنگ	گموز	پسته	۳۰ روز	۲/۵ در هزار	۹۲/۱۲/۵
۱۹۰	فوزتیل آلومینیوم	رودر	۸۰٪	WP	دوگال	گموز	مرکبات	۱۴ روز	۲ در هزار	۹۶/۵/۲
۱۹۱	فوزتیل آلومینیوم	فیتوکیور	۸۰٪	WP	گل سم گرگان Limin Chemical	انگومک	پسته	۱۴ روز	۲/۵ در هزار	۹۹/۱۰/۲۲
۱۹۲	فوزتیل آلومینیوم + فلوپیکولید	پروفایلر	۷۱/۱٪	WG	بایر آگ	سفیدک داخلی	انگور	۷ روز	۲-۲/۵ در هزار بسته به شدت بیماری در سه نوبت	۹۵/۸/۲۴
۱۹۳	عصاره گیاه اسپند ۱۳٪ (هارمین)	نانوپگان		نانوامولسیون	زیست کنترل نانو مقیاس	پوسیدگی فوزاریومی ریشه و ساقه	گوچه فرنگی		۱۵ در هزار	۱۴۰۳/۷/۱۶
۱۹۴	کروزکسیم متیل	استروبی	۵۰٪	WG	ب آ اس اف	سفیدک پودری	کدوئیان	۴ روز	۰/۲ در هزار	۸۷/۵/۲

۱۹۵	کینوسول (سولفات ۸- هیدروکسی کینولین)	بلتانول	۳۷/۵٪	SL	سبا کوشا کشت پروبلت فیتو اسپانیا	بوته میری Phytophthora melonis	خیار (گلخانه و فضای باز)	-	۰/۵ در هزار (نوبت اول) بلافاصله پس از کاشت و نوبت دوم بین مرحله ۲-۳ برگی همراه با آب آبیاری)	۹۸/۴/۱۰
۱۹۶	عصاره سیر	آلیسین	۵٪	ME	گیاه پرنیان اطلس Chengdu Newsun Crop Science	سفیدک پودری	خیار گلخانه ای	-	یک در هزار	۱۴۰۳/۱۲/۱۱
۱۹۷	۱۰٪ روغن سیر (۰/۰۳٪ آلیسین)+۳٪ اسانس میخک (۲/۲٪ اوژنول)	میلدیوکات Mildew Cut	۱۳٪	EC	پژوهشکده گیاهان دارویی	سفیدک پودری	خیار گلخانه ای	-	۵ در هزار	۱۴۰۳/۱۲/۱۱
۱۹۸	روغن میخک ۱۰٪+صمغ گیاهی کارنوبا ۹۰٪	Fresh Save HN		EC	دانش میوه خاورمیانه	پیشگیری کننده و درمان کننده کپک خاکستری	گلایی	-	۷ در هزار	۱۴۰۳/۱۱/۱۵
۱۹۹	ماندی پروپامید+ دیفنوکونازول	کاریال استار	۵۰٪	SC	سینجنتا	سفیدک داخلی	خیار(گلخانه)	۱ روز	۰/۷ در هزار (استفاده بیش از دو نوبت متوالی و بیش از ۴ نوبت در یک دوره تولید ممنوع است.	۹۷/۱۰/۱۷
۲۰۰	ماندی پروپامید+ دیفنوکونازول	کاریال استار	۵۰٪	SC	سینجنتا	لکه موجی- سفیدک داخلی	گوجه فرنگی	۳ روز	۷۰۰ میلی لیتر در هکتار در مناطق مرطوب کناره های دریای خزر و سواحل خلیج فارس	۱۴۰۲/۳/۲۹
۲۰۱	مایکلوپوتانیل	آتیس	۴۰٪	WP	سبزمحصول داتیس ناگارچونا اگری کم	لکه سیاه	سیب درختی	-	۰/۳ در هزار (به صورت تناوبی با قارچ-کش-های دیگر)	۹۷/۹/۲۶

۲۰۲	متا بی سولفیت سدیم	سولفور پد	۷ گرم متا بی سولفیت	پد کاغذی	اروم زرین خوشه	بیماریهای قارچی	انگور	-	یک بسته ۷ گرمی برای نگهداری ۵ کیلوگرم انگور	۸۶/۸/۲۸
۲۰۳	متالاکسیل ۳/۵ درصد + هیدروکسید مس ۱۸/۵ درصد	آر متیل آر	۲۲٪	SC	Industrias Quimicas Valles	سفیدک داخلی	گوجه فرنگی	-	۲/۵ در هزار	۹۹/۴/۹
۲۰۴	متالاکسیل ام (مفنوکسام) ۱۰ گرم/لیتر+فلودیوکسانیل ۲۵ گرم /لیتر	ماکسیم ایکس ال	۳/۵٪	FS	سینجنتا	فوزاریوم	ذرت		۱ در هزار	۱۴۰۰/۶/۱
۲۰۵	متالاکسیل ام (مفنوکسام) ۱۰ گرم/لیتر+فلودیوکسانیل ۲۵ گرم /لیتر	ماکسیم ایکس ال	۳/۵٪	FS	سینجنتا	بوته میری پیتیومی	گوجه فرنگی		۱ میلی لیتر در هر کیلوگرم بذر	۱۴۰۳/۱۰/۲۴
۲۰۶	متالاکسیل ام (مفنوکسام) ۱۰ گرم/لیتر+فلودیوکسانیل ۲۵ گرم /لیتر	هاکی ایکس ال (Hockey) (XL ۰۳۵ FS)		Fluid Concentrate for Seed Treatment	رویال ساکار تجارت	بوته میری پیتیومی و پوسیدگی فوزاریومی ریشه	گوجه فرنگی	۱۴ روز	۲/۵ میلی لیتر در کیلوگرم بذر برای ضد عفونی	۱۴۰۳/۱۰/۲۴
					دوگال				۲/۵ در هزار (محلول پاشی) در سه مرحله: یک بار به سینی نشا در زمان انتقال نشا (۳ لیتر در هر متر مربع سینی کشت) و دو بار پس از انتقال به مزرعه به فاصله یک هفته همراه آب آبیاری (۵۰ میلی لیتر برای هر بوته)	
۲۰۷	متالاکسیل	ریدومکس	۵٪	GR	اکسیر کشاورزی یزد Zhejiang Heben	بوته میری	خیار	-	۲ در هزار	۹۹/۹/۱۷

۹۹/۹/۱۷	۲ در هزار	-	خيار	بوته ميري	گياه Zhejiang Heben	GR	۵٪	ردوكسيل	متالاكسيل	۲۰۸
۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۲ گرم در متر مربع (گلخانه) به صورت گرانول پاشي	-	خيار	بوته ميري <i>Pythium aphaniderm atum</i>	گياه	GR	۵٪	ردوكسيل	متالاكسيل	۲۰۹
۹۸/۴/۱۰	۱/۵ ليتر در هزار	-	خيار(گلخانه و فضاى باز)	بوته ميري	سينجنتا	SE	۴۴/۶٪	يونيفورم	مفتوكسام ۱۲/۴٪+ آزوكسى استروبين ۳۲/۲٪	۲۱۰
۱۴۰۱/۹/۱	۳/۵ ليتر در هكتار در مناطق با آلودگى زياد	۱۴ روز	پياز	پوسيدگى فوزاريومى ريشه	گياه پرنيان اطلس Safa Tarim	SC	۳/۵٪	مالوين ايكس ال اف اس ۰۳۵	متالاكسيل ام ۱۰ گرم/ليتر+فلوديوكسانيل ۲۵ گرم/ليتر	۲۱۱
	۲/۵ ليتر در هكتار در مناطق با آلودگى كم									
۱۴۰۲/۵/۳۰	يك در هزار	۲۱ روز	انگور	سفيدك پودرى	ب آ اس اف	SC	۷/۵٪	رويونا	مفن ترى فلوكونازول	۲۱۲
۹۵/۶/۲۹	۴-۳ در هزار	صفر روز	خيار- گلخانه	سفيدك داخلى	JI Biotech	SL	۵۳٪	فسفايت	نمك هاى مونو و دى پتاسيم اسيد فسفونيك	۲۱۳
۱۴۰۰/۹/۲۹	۲/۵ در هزار	-	پسته	پوسيدگى فايتوفترائى ريشه و طوقه	بصير شيمى Agrichem	SL	۶۰٪	اگريفوس	نمك هاى مونو و دى پتاسيم اسيد فسفونيك	۲۱۴

۲۱۵	های مکسازول	تاچی گارن	۳۰٪	SL	Mitsui	پژمردگی فوزاریمی	گوجه فرنگی	۱۰ روز	قبل از انتقال نشاء یک در هزار، یک هفته بعد از انتقال نشاء دو در هزار و دو هفته پس از سمپاشی دوم به مقدار ۲ در هزار	۹۵/۱۰/۲۷
۲۱۶	هیدروکسید مس + اکسی کلرور مس	BADGE	۲۸٪	WG	بازارگان کالا ISAGRO	پیچیدگی برگ	هلو	-	۱/۲ در هزار	۱۴۰۰/۹/۱۵
۲۱۷	هیدروکسید مس + اکسی کلرور مس	BADGE	۲۸٪	WG	بازارگان کالا ISAGRO	سفیدک کرکی	گوجه فرنگی	سه روز	۲/۵ کیلوگرم در هکتار	۱۴۰۱/۵/۱۰
۲۱۸	عصاره سیر ، روغن پنبه دانه، روغن ذرت	میلدی کیور	۸۳٪	SL	بازرگان کالا Jh biotech	سفیدک پودری	خیار	-	مزرعه: ۱۰ در هزار	۹۶/۸/۲۹
									گلخانه: ۷/۵ در هزار	
۲۱۹	اسانس روغن بنه	روماک	۶۰٪	EC	روماک گستر غرب	کپک خاکستری	توت فرنگی	ندارد	۴ در هزار	۹۸/۱۰/۹