

قارچ کش های تصویب شده از سال ۱۳۸۶ تا پایان مهر ۱۴۰۳

ردیف	نام عمومی	نام تجاری	درصد	فرمولاسیون	شرکت	بیماری	محصول	کارنس	دز مصرف	تاریخ تصویب
۱	آزینو		۰/۱۳	L	جاوید شیمی فارس	جاروک	لیموترش		۴ در هزار	۱۴۰۳/۶/۲۶
۲	اپوکسی کونازول ۱۸۷ گرم /لیتر+تیوفانات متیل ۳۱۰ گرم/لیتر	رکس دو	۴۹/۷٪	SC	ب آ اس اف	بیماری فوزاریمی سنبله	گندم	۴۲ روز	۰/۵ لیتر در هکتار	۹۲/۳/۲۷
۳	اپوکسی کونازول ۱۸۷ گرم /لیتر+تیوفانات متیل ۳۱۰ گرم/لیتر	رکس دو	۴۹/۷٪	SC	ب آ اس اف	زنگ زرد	گندم	۴۲ روز	۰/۵ لیتر در هکتار	۹۷/۶/۲۷
۴	اپوکسی کونازول ۱۸۷ گرم /لیتر+تیوفانات متیل ۳۱۰ گرم/لیتر	رکس دو	۴۹/۷٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	چغندر قند	-	۰/۵ لیتر در هکتار	۹۷/۷/۱۶
۵	آزوکسی استروبین ۲۰۰ گرم/لیتر+ دیفنو کونازول ۱۲۵ گرم/لیتر	ارتیواتاپ	۳۲/۵٪	SC	سینجنتا	سفیدک پودری	جالیز- مزرعه.گلخانه	خیار: ۲ روز	مزرعه: ۱ لیتر در هکتار	۸۸/۹/۳۰
								۲ روز گوجه فرنگی:	گلخانه: ۰/۷۵ در هزار	
۶	آزوکسی استروبین ۲۰۰ گرم/لیتر+ دیفنو کونازول ۱۲۵ گرم/لیتر	ارتیواتاپ	۳۲/۵٪	SC	سینجنتا	لکه برگ سرکوسپورایی	چغندر قند	-	۱ لیتر در هکتار	۹۹/۱۰/۲۲
۷	آزوکسی استروبین ۲۰۰ گرم/لیتر+ دیفنو کونازول ۱۲۵ گرم/لیتر	ارتیواتاپ	۳۲/۵٪	SC	سینجنتا	لکه موجی	گوجه فرنگی	۳ روز	۱۳۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۸	آزوکسی استروبین+ دیفنو کونازول	سفیر	۳۲/۵٪	SC	بارزگانان سرای سپند	سفیدک پودری	خیار گلخانه	-	۰/۷۵ در هزار حداکثر دو بار سمپاشی	۹۷/۷/۱۶

۹	آزوکسی استروبین + دیفنو کونازول	دیفوروبین	۳۲/۵%	SC	کاوش کیمیای کرمان	سفیدک پودری	خیار گلخانه	-	۰/۷۵ در هزار حداکثر دو بار سمپاشی	۹۷/۷/۱۶
۱۰	آزوکسی استروبین + سیپروکونازول	آمیستاراکسترا	۲۸%	SC	سینجتا	زنگ زرد	گندم	۳۵ روز	۰/۷۵ لیتر در هکتار	۹۲/۸/۲۷
۱۱	آزوکسی استروبین ۱۲۵g/l + دیفنوکونازول ۱۲۵ g/l	بیکانتا	۲۵%	SC	سینجتا	سپتوریای برگ	گندم		یک لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۱۱/۳
۱۲	اسپیروکسامین	پروسپر	۳۰%	CS	بایرا گ	سفیدک سطحی	انگور	۱۴ روز	۰/۷ در هزار در مرحله جوانه زنی شاخه ها و با فاصله ۱۴ روز از سمپاشی اول با دز ۱/۲ در هزار	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۱۳	اسپیروکسامین + تبو کونازول + تریادیمنول	فالکن	۴۶%	EC	بایرا گ	زنگ زرد	گندم	۳۰ روز	۰/۶ لیتر در هکتار	۹۲/۸/۲۷
۱۴	اسپیروکسامین + تبو کونازول + تریادیمنول	فالکن	۴۶%	EC	بایرا گ	فوزاریوم سنبله	گندم	۳۰ روز	۰/۷-۰/۸ لیتر در هکتار	۹۴/۳/۲۵
۱۵	اکسی کلرور مس	اکسی کلرور پرتونار	۳۵%	SC	پرتونار ویمال هند	سفیدک کرکی	خیار	۳-۷ روز	۳/۵ در هزار	۱۴۰۰/۶/۲۰
۱۶	اکسی کلرور مس	کیمیا کوپر اکسی	۳۵%	SC	کاوش کیمیای کرمان شیام کمیکالز	سفیدک کرکی	خیار	۳-۷ روز	۳/۵ در هزار	۱۴۰۰/۶/۱
۱۷	اکسی کلرور مس	فلیت	۵۰%	WP	بصیر شیمی پارس ایزاگرو ایتالیا	گموز فایتوفترایی طوقه پوسیدگی ریشه	مرکبات		۱۰۰ گرم در لیتر	۱۴۰۲/۱۰/۲۵

۱۸	اکسی کلرور مس + سیمو کسانیل	کوپروسیت سی	۴۳/۹۵%	WP	دلتا پارس نهاده اگریا	سفیدک داخلی	خیار	۵ روز	۳ کیلو گرم در هکتار	۹۴/۶/۲۳
۱۹	اکسی کلرور مس + مفنوکسام (متالاکسیل ام)	ریدومیل گلد آر	۱۶/۱۹%	WG	سینجنتا	سفیدک کرکی	خیار	۳ روز	گلخانه ۶: در هزار فضای باز: ۶ کیلوگرم در هکتار (دوبار سمپاشی در فصل زراعی به فاصله ۱۴ روز)	۱۴۰۰/۹/۲۹
۲۰	اکسید مس	ردشیلد	۴۵%	WG	رها اندیش کاوان	آنتراکنوز	گردو	-	۲ در هزار	۹۹/۱۱/۶
۲۱	اکسید مس	نوردوکس	۷۵%	WG	نوردوکس آ.اس نروژ	آتشک	درختان میوه دانه دار	۱۵ روز	۱ در هزار	۹۱/۶/۲۰
۲۲	اکسید مس	نوردوکس	۷۵%	WG	نوردوکس آ.اس نروژ	پیچیدگی برگ	هلو	۱۵ روز	۲/۵ در هزار	۹۰/۴/۱۳
۲۳	اکسید مس	نوردوکس	۷۵%	WG	نوردوکس آ.اس نروژ	سفیدک داخلی	سیب زمینی	۱۵ روز	۱ کیلوگرم در هکتار	۹۴/۷/۶
۲۴	اکسید مس	رد شیلد	۴۵%	WG	رها اندیش کاوان Nordox	شانکر باکتریایی <i>Pseudomonas syringae</i>	درختان میوه هسته دار	۱۵ روز	۲ در هزار	۱۴۰۱/۵/۱۰
۲۵	اکسید مس	نوردوکس	۷۵%	WG	نوردوکس آ.اس نروژ	پوسیدگی طوقه و ریشه	برنج	-	۱۳۰ گرم برای یکصد کیلوگرم بذر	۹۶/۴/۱۹
۲۶	اکسید مس (نوردوکس) ۲۵/۸%+متالاکسیل ۶%	نوردوکسیل	۳۱/۸%	SC	پیرا کشت Zhejiang Heben Pesticides and chemical	سفیدک داخلی	توتون	-	۱/۵ لیتر در هکتار (خزانة) ۲ لیتر در هکتار (مزرعه)	۱۴۰۰/۹/۲۹

۲۷	اکسی کلرور مس(دارای ۵۸/۳ % مس)	کوپراکسی کلرید مس برزگر	۸۵%	WP	برزگر برجسته Agro life Science corporation	پیچیدگی برگ	هلو	-	۴ در هزار	۱۴۰۰/۹/۱۵
۲۸	اکسی کلرور مس	کوپر پلاس	۵۰%	WP	آرمان سبز آدینه شیام کمیکالز	سفیدک کرکی	گوجه فرنگی	۳ روز	۲ در هزار	۱۴۰۰/۴/۱۴
۲۹	آمتوکترا دین + دیمتومورف	اوروگو	۵۲/۵%	SC	ب آ اس اف	سفیدک داخلی	خیار (فضای باز و گلخانه)	۱ روز	۰/۷ در هزار استفاده بیش از دو نوبت متوالی و بیش از چهار نوبت در یک دوره تولید ممنوع است.	۹۷/۱۰/۱۷
۳۰	آمتوکترا دین + دیمتومورف	اوروگو	۵۲/۵%	SC	ب آ اس اف	سفیدک داخلی	هندوانه	۱ روز	۰/۷ در هزار در فواصل زمانی ۷-۱۰ روز جهت کنترل بیماری	۹۹/۲/۸
۳۱	آمتوکترا دین + دیمتومورف	اوروگو	۵۳/۵%	SC	ب آ اس اف	سفیدک داخلی	انگور	۱ روز	۱ در هزار، در فواصل زمانی ۷-۱۰ روز جهت کنترل بیماری	۹۹/۴/۳۰
۳۲	پنفلوفن	امستوپرایم	۵%	FS	بایر	شانکر ریزوکتونیایی و شوره سیاه	سیب زمینی		۴۰۰ میلی لیتر برای ۱۰۰۰ کیلوگرم غده بذری به صورت ضد عفونی	۱۴۰۲/۴/۱۹
۳۳	پیری متانیل	میلیس	۳۰%	SC	گیاه پر نیان اطلس Safa tarim	کپک خاکستری	توت فرنگی گلخانه	-	یک در هزار و در تناوب با سایر قارچ-کش ها و حداکثر دوبار در سال	۹۸/۱۱/۲۸

۱۴۰۳/۳/۲۱	دو در هزار	-	مرکبات	کپک سبز	دانش میوه خاورمیانه	EC		زداتان ۲۰	پریمتانیل ۱۸۷/۲ گرم/لیتر + روغن میخک ۱۸۵ گرم/لیتر	۳۴
					Xeda					
۱۴۰۳/۳/۲۱	۲ لیتر به ازای هر ۱۰۰۰ کیلو میوه	-	مرکبات	کپک سبز	دانش میوه خاورمیانه	واکس آماده مصرف		مکسی فرش	پریمتانیل ۰/۱۴٪ + صمغ گیاهی کارنوبا ۱۹٪	۳۵
					پریمتانیل تولید شرکت xeda فرانسه					
۸۶/۱۰/۱۰	۲٪ وزن غده	-	سیب زمینی	شانکر ریزو کتونیایی ساقه و شوره سیاه غده	بایر آگ	WP	۵۰٪	رورال	ایپرودیون	۳۶
۹۹/۴/۳۰	۴ لیتر به ازای ۱۰۰۰ کیلوگرم غده بذری	-	سیب زمینی	شانکر ریزو کتونیایی ساقه و شوره سیاه غده	پاک سم ایرانیان jiangsu Lanfeng	SC	۲۶٪	رست آپ	ایپرودیون ۱۷۵ + کاربندازیم ۸۵ (گرم /لیتر)	۳۷
۹۶/۳/۱	۱/۲۵ لیتر در هکتار	۱۴ روز	برنج	بلاست	مشکفام فارس نیهون نوهیاکو	EC	۴۰٪	فوجی وان	ایزوپروتیولان	۳۸
۹۲/۴/۱۷	۰/۷۵-۰/۵ کیلوگرم در هکتار	۱ روز	خیار	سفیدک پودری	نیپون سودا	WP	۴۰٪	بلکیوت	ایمینو کتادین تریس	۳۹
۹۳/۳/۱۲	۷۵۰ گرم در هکتار	۷ روز	سیب زمینی	لکه موجی (آلترناریا)	نیپون سودا	WP	۴۰٪	بلکیوت	ایمینو کتادین تریس	۴۰
۹۵/۸/۲۴	۰/۷۵ در هزار	۷ روز	انگور	سفیدک پودری	نیپون سودا	WP	۴۰٪	بلکیوت	ایمینو کتادین تریس	۴۱

۹۷/۲/۲۴	۱۸۰ گرم در هکتار	۲ روز	برنج	بلاست	گیاه پرنیان اطلس Deqiang Biology	WP	۵٪	کانگ می	باسیلوس سوبتیلیس	۴۲
۱۴۰۱/۴/۲۰	۱/۲۵ در هزار	-	گوچه فرنگی	لکه موجی آلترناریایی	گیاه پرنیان اطلس Deqiang Biology	WP	۵٪	کانگ می	باسیلوس سوبتیلیس	۴۳
۹۸/۸/۲۷	در سه مرحله به ترتیب با دزهای ۵، ۴ و ۵ لیتر در هکتار	ندارد	گوچه فرنگی گلخانه	پژمردگی فوزاریوم	رویان تيسان	SC	۱۰ ^۸	پارس باسیل	باسیلوس ولزنسیس	۴۴
۹۸/۱۰/۹	۵ در هزار	ندارد	توت فرنگی گلخانه	کپک خاکستری	بایر آلمان	SC	۱۰ ^{۱۲}	سرناد	باسیلوس سوبتیلیس <i>Bacillus subtilis</i>	۴۵
۱۴۰۰/۹/۲۲	۱۰ لیتر در هکتار به روش خیساندن خاک پس از انتقال نشاء	ندارد	گوچه فرنگی گلخانه	پژمردگی فوزاریومی	بایر آلمان	SC	۱۰ ^{۱۲}	سرناد	باسیلوس سوبتیلیس <i>Bacillus subtilis</i>	۴۶
۹۹/۴/۳۰	۲۰۰ گرم در هکتار، ۴۵ و ۹۰ روز پس از کاشت	ندارد	چغندر قند	پوسیدگی ریزوکتونایی ریشه	زیست فناوری سبز	پودر مرطوب	۱۰ ^۷	روبین ۱	باسیلوس سوبتیلیس	۴۷
۹۳/۱۲/۴	۱۰ در هزار دو مرحله	۷ روز	زردآلو	بیماری غربالی	سبزآور پردیس	SC	۱۸٪	میشو بردوکس	مخلوط بردو	۴۸
۹۴/۱۰/۷	۲ درصد محلول پاشی توأم با پانسمان شانکر با بردو کیمیا ۸ درصد	۷ روز	درخت سیب	شانکر سیتوسپرای	کاوش کیمیا کرمان	SC	۱۸٪	بردو کیمیا	مخلوط بردو	۴۹

۵۰	مخلوط بردو	بردو بهسم	۱۸٪	SC	البرز بهسم	غربالی	زردآلو	۷ روز	۱۰ در هزار	۹۶/۱۱/۱۶
	ماده موثره سولفات مس و هیدروکسید کلسیم									
۵۱	مخلوط بردو	بردو سیف	۱۸٪	SC	سبزآور نگین فلات	آتشک	درختان میوه دانه دار	۷ روز	۸ در هزار در مرحله جوانه و ۵۰ در هزار در مرحله ۵ درصد، ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد گل	۹۶/۲/۲۵
۵۲	مخلوط بردو	بردو سیف	۱۸٪	SC	سبزآور نگین فلات	سفیدک داخلی	خیار(گلخانه)	-	۵ در هزار	۹۷/۹/۲۶
۵۳	مخلوط بردو	بردو سیف	۱۸٪	SC	سبزآور نگین فلات	پیچیدگی برگ	هلو	-	۸ در هزار	۹۸/۳/۲۷
۵۴	مخلوط بردو	بردو سمیران	۲۰٪	SC	سمیران	پیچیدگی برگ	هلو	۷ روز	۸-۵ در هزار در زمان ریزش برگ-ها در پاییز و تورم جوانه-ها در بهار	۹۶/۳/۱
۵۵	مخلوط بردو	بردو کسین	۲۰٪	SC	اکسین شیمی آدان	سفیدک داخلی	خیار(گلخانه)	-	۵ در هزار	۹۷/۹/۲۶
۵۶	مخلوط بردو	بردو تکس	۲۰٪	SC	پرتونار	سفیدک داخلی	خیار(گلخانه)	-	۵ در هزار	۹۷/۹/۲۶
۵۷	مخلوط بردو	بردو تکس	۲۰٪	SC	پرتونار	پیچیدگی برگ	هلو	-	۹ در هزار	۹۸/۳/۲۷
۵۸	مخلوط بردو	بردو فیکس	۱۸٪	SC	باغبان تاک	سفیدک داخلی	گوجه فرنگی	۷ روز	۵ در هزار	۹۷/۳/۲۸
۵۹	مخلوط بردو	بردو فیکس	۱۸٪	SC	باغبان تاک	آتشک درختان میوه	دانه دار	۷ روز	۱۰ در هزار در مرحله جوانه و ۴ در هزار در مراحل ۵، ۵۰ و ۱۰۰ درصد گل	۹۷/۸/۱۴
۶۰	مخلوط بردو	سولفیکس	۸۰٪	SC	باغبان تاک	سفیدک پودری	انگور	-	۲/۵ در هزار	۹۸/۳/۲۷

۹۸/۳/۲۷	۱۰ در هزار	-	هلو	پیچیدگی برگ	باغبان تاک	SC	۱۸٪	بردوفیکس	مخلوط بردو	۶۱
۹۷/۹/۲۶	۵ در هزار	-	خیار(گلخانه)	سفیدک داخلی	باغبان تاک	SC	۱۸٪	بردوفیکس	مخلوط بردو	۶۲
۹۷/۱۲/۱۳	۹ در هزار	-	زردالو	غربالی	گیاه	SC	۲۰٪	بردوجی	مخلوط بردو	۶۳
۹۹/۴/۳۰	۱۵ در هزار	-	زردالو	غربالی	فرآورده های طیف سبز	SC	۱۸٪	بردوطیف	مخلوط بردو	۶۴
۱۴۰۰/۹/۱۵	۵ لیتر در هکتار	۳ روز	سیب زمینی	سفیدک کرکی	خزرسم کود مانیکا ایتالیا	SC	۱۰٪	MANIFLOW	مخلوط بردو	۶۵
۱۴۰۳/۶/۲۶	۶ در هزار	-	درختان میوه هسته دار	شانکر باکتریایی	گیاه	WP	۲۴٪		مخلوط بردو	۶۶
۹۹/۶/۲۴	۳ کیلوگرم در هکتار در تناوب با سایر قارچ کش های ثبت شده	۷ روز	خیار	سفیدک کرکی	خزرسم کود مانیکا ایتالیا	WP	۳۳٪	توتور	مخلوط بردو ۱۵٪(CU) + فوزتیل آلومینیوم ۱۸٪	۶۷
۹۸/۱۰/۲۳	یک در هزار(حداکثر دو بار در سال)	-	گوجه فرنگی	سفیدک پودری	بازرگانان سرای سپند پارس Shandong Kangqiao	WG	۳۸٪	یونیلیس	بوسکالید + پیراکلواستروبین	۶۸
۸۹/۹/۲۹	۰/۷ در هزار مناطق خشک، ۱ در هزار مناطق مرطوب	۷ روز	هلو- شلیل	سفیدک پودری	ب آ اس اف	WG	۳۸٪	بلیس	بوسکالید + پیراکلواستروبین	۶۹

۷۰	بوسکالید+ پیراکلواستروبین	بلیس	۳۸٪	WG	ب آ اس اف	سفیدک پودری	سیب درختی	-	۰/۷ در هزار و در تناوب با سایر قارچکش-ها و حداکثر دوبار در سال	۹۷/۱۲/۱۳
۷۱	بوسکالید+ پیراکلواستروبین	سیگنوم	۳۳/۴٪	WG	ب آ اس اف	آلترناریا	گوجه فرنگی	۳ روز	۰/۵ کیلوگرم در هکتار	۹۴/۱۲/۱۰
۷۲	بوسکالید+ پیراکلواستروبین	سیگنوم	۳۳/۴٪	WG	ب آ اس اف	آلترناریا	سیب زمینی	۳ روز	۰/۵ کیلوگرم در هکتار	۹۵/۳/۱۷
۷۳	بوسکالید+ پیراکلواستروبین	سیگنوم	۳۴/۴٪	WG	ب آ اس اف	کپک خاکستری	توت فرنگی گلخانه	۳ روز	۱/۵ در هزار و در تناوب با سایر قارچ-کش-ها و حداکثر دوبار در سال	۹۸/۱۱/۲۸
۷۴	بوسکالید+ پیراکلواستروبین	سیگنوم	۳۳/۴٪	WG	ب آ اس اف	افتادگی برگ	کاهو	۳ روز	۱/۵ کیلو گرم در هکتار حداکثر دو مرحله و با رعایت فاصله ۱۴	۹۹/۳/۱۲
۷۵	بوسکالید+ پیراکلواستروبین	سیگنوم	۳۳/۴٪	WG	ب آ اس اف	کپک خاکستری	خیار	۳ روز	۱/۲۵ در هزار	۱۴۰۰/۷/۲۶
۷۶	بوسکالید ۲۶۷ گرم/کیلوگرم+ پیراکلواستروبین ۶۷ گرم/کیلوگرم	سیگنوم	۳۳/۴٪	WG	ب آ اس اف	سوختگی استمفیلیومی برگ	سیر	۳ روز	۱۲۰۰ گرم در هکتار	۱۴۰۳/۴/۱۱
۷۷	بوسکالید ۲۶۷ گرم/کیلوگرم+ پیراکلواستروبین ۶۷ گرم/کیلوگرم	سیگنوم	۳۳/۴٪	WG	ب آ اس اف	کپک خاکستری	فلفل گلخانه ای	۳ روز	۱ در هزار	۱۴۰۳/۷/۱۶
۷۸	بوسکالید+ کرزوکسیم متیل	کولیس	۳۰٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	هلو- شلیل	۷ روز	۰/۵ در هزار	۸۹/۹/۲۹
۷۹	بوسکالید+ کرزوکسیم متیل	کولیس	۳۰٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	خیار	-	۰/۴ در هزار	۹۶/۹/۱۳
۸۰	بوسکالید+ کرزوکسیم متیل	کولیس	۳۰٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	گوجه فرنگی (فضای باز)	-	۰/۵ در هزار	۹۸/۴/۱۰
۸۱	بی کربنات پتاسیم	کالیبان	۸۵٪	SP	کیمیاسبز آور	سفیدک پودری	جالیز - گلخانه	-	۵ در هزار	۹۰/۱۲/۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۰/۷ در هزار	-	انگور	سفیدک پودری	سینجنتا	SC	۲۰٪	میراویس دیوو	پایدیفلموتوفن ۷۵ (آدپیدین) گرم/کیلوگرم+دیفنو کونازول ۱۲۵ گرم/کیلوگرم	۸۲
۱۴۰۲/۵/۳۰	۰/۸ در هزار	-	سیب	سفیدک پودری	سینجنتا	SC	۲۰٪	میراویس دیوو	پایدیفلموتوفن ۷۵ (آدپیدین) گرم/کیلوگرم+دیفنو کونازول ۱۲۵ گرم/کیلوگرم	۸۳
۱۴۰۳/۵/۱	دو در هزار		گندم	سیاهک پنهان (ضد عفونی بذور)	پاک گستر پرند	SL	۲۰٪	فورمایسین گلد پی ایکس	پراستیک اسید+پراکسید هیدروژن	۸۴
۹۷/۱۲/۱۳	یک لیتر در هکتار	-	گندم	زنگ زرد	بهاور شیمی آستک	EC	۲۵٪	بهتیل	پروپیکونازول	۸۵
۹۹/۶/۲۴	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	۲۱	گندم	سپتوریوز	گیاه پر نیان اطلس Safa tarim	EC	۳۰٪	هاربور	پروپیکونازول ۱۵ درصد+ دیفنو کونازول ۱۵ درصد	۸۶
۸۹/۳/۱۰	۱۵-۱۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	-	گندم	سیاهک پنهان معمولی	بایرا آگ	FS	۴۰٪	لاماردور	پروتیو کونازول + تبوکونازول	۸۷
۸۹/۹/۱	۲۰ میلی-لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	-	گندم	سیاهک آشکار	بایرا آگ	FS	۴۰٪	لاماردور	پروتیو کونازول + تبوکونازول	۸۸
۹۶/۴/۱۹	۱۵ میلی-لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	-	جو	سیاهک آشکار	بایرا آگ	FS	۴۰٪	لاماردور	پروتیو کونازول + تبوکونازول	۸۹

۹۰	پروتیو کونازول گرم /لیتر +۱۵۰ تبو کونازول ۲۰ گرم /لیتر	ردیگو پرو	۱۷٪	FS	بایر آگ	سیاهک پنهان معمولی	گندم	-	نیم در هزار	۱۴۰۳/۲/۳
۹۱	پروپامو کارب هیدرو کلراید و فوزتیل آلومینیوم	پرویکورانرژوی	۸۴٪	SL	بایر آگ	بوته میری	خیار	۳ روز	۳ لیتر در هکتار در مزرعه به صورت شنی در گلخانه به منظور ضد عفونی خاک جهت کنترل عامل بیماری فوق به مقدار ۰/۳ لیتر در هر متر مکعب خاک به صورت مخلوط با خاک	۹۲/۷/۸
۹۲	پروپامو کاب هیدرو کلراید + فلوپیکولید	اینفینیتو	۶۸/۷۵٪	SC	بایر آگ	سفیدک داخلی	خیار- گلخانه	۱ روز	۲ در هزار	۹۲/۸/۷
۹۳	پروپامو کاب هیدرو کلراید + فلوپیکولید	اینفینیتو	۶۸/۷۵٪	SC	بایر آگ	سفیدک داخلی	سیب زمینی	۷ روز	۱/۲ لیتر در هکتار	۹۴/۷/۶
۹۴	پروپامو کارب هیدرو کلراید + سیموکسانیل	پروکسانیل	۴۵٪	SC	بازرگان کالا Arysta life science	سفیدک داخلی	سیب زمینی	-	۲/۵ لیتر در هکتار	۹۴/۷/۶
۹۵	پروپامو کارب هیدرو کلراید + سیموکسانیل	ریوالدو	۴۵٪	SC	دلتا پارس نهاده آگریا	سفیدک داخلی	خیار	۳-۷ روز	۲ در هزار ۲ لیتر در هکتار در فضای باز	۱۴۰۰/۹/۲۹

۹۶	پروپامو کارب هیدروکلراید	پروپلنت	۷۲/۲٪	SL	بازرگان کالا Arysta life science	بوته میری <i>Pythiumaph nidermatum</i>	خیار	-	۱ در هزار در زمان کشت بذر و انتقال نشا و ۰/۷۵ در هزار دو هفته پس از انتقال نشا	۹۶/۱۱/۳۰
۹۷	پروپیکونازول+فلوکساپیروکساد+پیراک لواستروبین	اینور	۳۵/۵٪	EC	ب آ اس اف	زنگ زرد	گندم	-	نیم لیتر در هکتار	۹۷/۱۲/۱۳
۹۸	پروکلراز	آکورد	۵۰٪	WP	فرتی اگرو	پوسیدگی خشک	قارچ خوراکی	-	۰/۹ گرم در هر متر مربع	۹۲/۸/۲۷
۹۹	پنسیکرون	مونسرن	۲۵٪	FS	بایر آ گ	شانکر ریزوکتونیایی	سیب زمینی	-	۱-۱/۲۵ در هزار (ضد عفونی بذر)	۹۹/۴/۳۰
۱۰۰	پیراکلواستروبین	سلتیما	۱۰٪	CS	BASF	بلاست	برنج	۳۵ روز	۱۰۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۳/۳/۲۱
۱۰۱	پیراکلواستروبین + دیمتومورف	پیرادیم	۱۸/۷٪	DF	برزگر برجسته Jiangsu Greenscie Chemical	سفیدک داخلی	خیار(گلخانه)	-	۰/۳۵ در هزار(بیش از سه نوبت متوالی و بیش از شش نوبت در یک دوره تولید ممنوع است).	۹۷/۱۰/۱۷
۱۰۲	پیراکلواستروبین + دیمتومورف	پیرادیم	۱۸/۷٪	DF	برزگر برجسته Jiangsu Greenscie Chemical	سوختگی الترناریایی	پسته	-	۰/۷۵ در هزار	۱۴۰۱/۴/۲۰
۱۰۳	پیراکلواستروبین + فلوکساپیروکساد	پریاکسور	۲۲/۵٪	EC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	گندم	-	۱/۵ لیتر در هکتار	۹۹/۳/۱۲

۱۴۰۰/۹/۱۵	۰/۳-۰/۴ در هزار در طول فصل رویش همراه با آب آبیاری دوبار در فصل کاشت	-	خیار گلخانه	عامل پیشگیرانه بیماری گیاهچه میری	بازارگان کالا Biopreparaly	WP		پلی ورسوم	<i>Pythium Oligandrum</i> Drechsler	۱۰۴
۹۷/۲/۳۰	۶۰ کیلوگرم برای بذرمال کردن ۴ تن غده سیب زمینی در هکتار	ندارد	سیب زمینی	پژمردگی ورتیسیلیومی	بهاران دشت ساحل	ذرات جامد قابل انتشار در آب	۱۰ ^۹	تالارومین	تالارومیسس فلاووس	۱۰۵
۹۴/۳/۱۱	۱ لیتر در هکتار	-	ساقه کلزا	پوسیدگی اسکروتنیایی	بایر آگ	EW	۲۵٪	فولیکور	تبوکونازول	۱۰۶
۹۵/۹/۲۹	۵۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	-	گندم	سیاهک پنهان معمولی	بیستر فیلد	FS	۶٪	آرتمیس	تبوکونازول	۱۰۷
۹۷/۱۲/۱۳	یک لیتر در هکتار	-	گندم	زنگ زرد	گل سم گرگان نینگ بوسانجوی	EW	۲۵٪	تبوکور	تبوکونازول	۱۰۸
۹۷/۱۲/۱۳	۰/۴ لیتر در هکتار	-	گندم	زنگ زرد	گیاه پرنیان اطلس تاید کراپ-ساینس	SC	۴۰٪	تایدتو	تبوکونازول	۱۰۹
۸۹/۱۰/۱۳	۱۰۰ میلی لیتر برای ضد عفونی یکصد کیلوگرم بذر ۳۰ میلی لیتر برای ضد عفونی یکصد کیلوگرم بذر	-	گندم	سیاهک آشکار سیاهک پنهان	ایزاگرو	LS	۱۲/۵٪	لوسپل	تتراکونازول	۱۱۰
۹۸/۱۰/۲۳	یک در هزار	-	رز	سفیدک پودری	آریاشیمی Ningbo + Sunjoy Jiangsu	SC	۳۲٪	آذیلون	تبوکونازول + آزوکسی استروبین	۱۱۱

۱۱۲	تتراکونازول+آزوکسی استروبین	آفیانس	۱۸٪	SC	بازرگان کالا Isagro	سفیدک پودری	هلو	-	۰/۶ در هزار	۱۴۰۱/۴/۲۰
۱۱۳	تتراکونازول+آزوکسی استروبین	آفیانس	۱۸٪	SC	بازرگان کالا Isagro	لکه موجی	گوجه فرنگی	۳ روز	۶۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۲/۳/۲۹
۱۱۴	تبوکونازول + پیراکلواستروبین	پیلارتن	۳۰٪ (۳۴۵ گرم/لیتر)	SC	ساعی گل تهران Jiangsu Mindleader crop science	سفیدک پودری	گندم	-	۶ دهم لیتر در هکتار	۱۴۰۰/۹/۱
۱۱۵	تتراکونازول	دومارک	۱۰٪	EC	ایزاگرو	سفیدک پودری	جالیز	۳ روز	۰/۵ لیتر در هکتار در مزرعه	۸۸/۸/۱۱
									۰/۴ در هزار در گلخانه	
۱۱۶	تتراکونازول	دومارک	۱۰٪	EC	ایزاگرو	سفیدک پودری	سیب	۱۴ روز	۰/۳ در هزار	۹۲/۳/۲۷
۱۱۷	تتراکونازول	امی ننت	۱۲/۵٪	ME	ایزاگرو	سفیدک پودری	چغندر قند	۲۱ روز	۰/۸-۱ لیتر در هکتار	۹۰/۷/۴
۱۱۸	تریادیمنول	بایتان	۷/۵٪	DS	بایر آگ	سیاهک آشکار	جو	-	۱۵۰ گرم برای یکصد کیلوگرم بذر	۸۹/۳/۱۰
۱۱۹	تری تیکونازول	رنال	۲۰٪	FS	ب آ اس اف	سیاهک آشکار	جو	-	۲۰ میلی لیتر برای ضد عفونی یکصد کیلوگرم بذر	۸۹/۳/۱۰
۱۲۰	تری فلوکسی استروبین	فلینت	۵۰٪	WG	بایر آگ	سفیدک پودری	جالیز- مزرعه	۱ روز	۲۰۰ گرم در هکتار	۸۸/۸/۱۱
۱۲۱	تری فلوکسی استروبین	فلینت	۵۰٪	WG	بایر آگ	سفیدک پودری	گوجه فرنگی- مزرعه	۱ روز	۲۵۰ گرم در هکتار	۹۶/۵/۲

۱۲۲	تری فلوکسی استروبین ۱۴٪+بوسکالید ۴۲٪		۵۶٪	SC	ناردان توسعه یزد	سفیدک پودری	انگور	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۱۴۰۳/۵/۲۲
۱۲۳	تری فلوکسی استروبین+ تبوکونازول	ناتیوو	۷۵٪	WG	بایر آگ	بلاست	برنج	۲۱ روز	۱۶۰ گرم در هکتار	۹۲/۳/۶
۱۲۴	تری فلوکسی استروبین+ تبوکونازول	ناتیوو	۷۵٪	WG	بایر آگ	لکه سیاه	سیب	۱۴ روز	۰/۳-۰/۲ در هزار	۹۴/۵/۱۲
۱۲۵	تری فلوکسی استروبین+ تبوکونازول	ناتیوو	۷۵٪	WG	بایر آگ	سفیدک پودری	سیب	۱۴ روز	۰/۳ در هزار	۹۵/۶/۱
۱۲۶	تری فلوکسی استروبین+ تبوکونازول	ناتیوو	۷۵٪	WG	بایر آگ	سفیدک پودری	چغندر قند	-	۲۰۰ گرم در هکتار	۹۵/۶/۱
۱۲۷	تری فلوکسی استروبین+ تبوکونازول	ناتیوو	۷۵٪	WG	بایر آگ	شیت بلایت	برنج	۲۱ روز	۱۶۰ گرم در هکتار	۹۶/۹/۱۳
۱۲۷	تری فلوکسی استروبین+ تبوکونازول	فلونازول	۷۵٪	WG	بازرگانان سرای سپند پارس CAC Nantong	بلاست	برنج	۲۱ روز	۱۶۰ گرم در هکتار	۹۸/۱۱/۱۴
۱۲۸	تری فلوکسی استروبین+ تبوکونازول	تیلما	۳۷/۵٪	SC	پاک سم ایرانیان &sunjoy CAC Nanton	بلاست	برنج	-	۳۲۰ میلی لیتر در هکتار	۹۸/۱۱/۱۴
۱۲۹	تری فلوکسی استروبین ۵۰٪+ تبوکونازول ۲۵٪	ایوت	۷۵٪	WG	گل سم گرگان &sunjoy CAC Nanton	بلاست	برنج	-	۱۶۰ گرم در هکتار	۹۸/۱۱/۱۴
۱۳۰	تری فلوکسی استروبین+ فلوپیرام	لونا سن سیشن	۵۰٪	SC	بایر آگ	سفیدک پودری	سیب	۱۴ روز	۰/۲ در هزار	۹۶/۲/۲۵

۱۳۱	تری فلوکسی استروبین + فلوپیرام	لونا سن سیشن	۵۰٪	SC	بایر آگ	لکه سیاه	سیب	۱۴ روز	۰/۲ در هزار	۹۶/۳/۱
۱۳۲	تری فلوکسی استروبین + فلوپیرام	لونا سن سیشن	۵۰٪	SC	بایر آگ	سفیدک پودری	خیار-گلخانه	۳ روز	۰/۲ در هزار	۹۶/۳/۱
۱۳۳	تری فلوکسی استروبین + فلوپیرام	لونا سن سیشن	۵۰٪	SC	بایر آگ	سفیدک پودری	گوجه فرنگی- مزرعه	۵ روز	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۶/۵/۲
۱۳۴	تری فلوکسی استروبین + فلوپیرام	لونا سن سیشن	۵۰٪	SC	بایر آگ	کپک خاکستری	خیار	-	۴ دهم در هزار	۱۴۰۰/۷/۲۶
۱۳۵	تری فلومیزول	تریفمین	۱۵٪	EC	رهااندیش کاوان نپون سودا	سفیدک پودری	درختان سیب	-	یک در هزار	۹۹/۱۰/۹
۱۳۶	تری فلومیزول + سایفلوفنامید	پانچو تی اف	۱۸/۴٪	WG	رهااندیش کاوان نپون سودا	سفیدک پودری	هلو	۱۴ روز	۷۵ / ۰ در هزار	۹۹/۱۰/۱
۱۳۷	تری فلومیزول + سایفلوفنامید	پانچو تی اف	۱۸/۴٪	WG	رهااندیش کاوان نپون سودا	مومیایی	هلو	۱۵ روز	۷۵ / ۰ در هزار	۱۴۰۰/۴/۱۴
۱۳۸	تریفورین	ساپرول	۱۹٪	DC	سومیتومو	لکه آجری	بادام	-	۰/۳ در هزار	۹۶/۱۱/۳۰
۱۳۹	تریتیوکونازول + پیراکلواستروبین	اینشورپرفرم	۱۲٪	FS	ب آ اس اف	سیاهک پنهان معمولی	گندم	-	۰/۴- ۰/۵ در هزار	۹۸/۱۲/۲۸
۱۴۰	تریتیوکونازول + پیراکلواستروبین	اینشورپرفرم	۱۲٪	FS	ب آ اس اف	سیاهک آشکار	گندم	-	۰/۵ در هزار	۱۴۰۰/۹/۱

۱۴۱	تیفلوزامید	آچمز	۲۴٪	SC	گروه شهر سبز و سلامت پارسیان Shandong kangqiao	سوختگی غلاف برگ برنج(شیت بلایت)	برنج	۲۱ روز	۳۰۰ سی سی در هکتار در تناوب با سایر قارچ کش ها	۹۹/۳/۲۶
۱۴۲	تیوفانات متیل + تری سیکلازول	ویستا	۷۲/۵٪	WP	نیپون سودا ژاپن	بلاست برگ و خوشه	برنج	۲۱ روز	۰/۴-۰/۵ کیلوگرم در هکتار	۹۰/۳/۳۰
۱۴۳	تریکودرما هارزیانوم	تریانوم پی	۱۰ ^۹	WP	گیاه کوپرت هلند	پژمردگی فوزاریومی	گوجه فرنگی گلخانه	ندارد	۳۰-۴۰ گرم برای هزار گیاه	۹۱/۲/۹
۱۴۴	تریکودرما هارزیانوم	تریانوم پی	۱۰ ^۹	WP	گیاه کوپرت هلند	پژمردگی فوزاریومی	خیار گلخانه	ندارد	۳۰-۴۰ گرم برای هزار گیاه	۹۱/۲/۹
۱۴۵	تریکودرما هارزیانوم	تریانوم جی	۱۰ ^۹	G	گیاه کوپرت هلند	پژمردگی فوزاریومی	طالبی	ندارد	۱۵-۲۰ کیلوگرم در هکتار	۹۷/۹/۲۱
۱۴۶	تریکودرما هارزیانوم	تریانوم جی	۱۰ ^۸	G	گیاه کوپرت هلند	پژمردگی فوزاریومی	گوجه فرنگی گلخانه	ندارد	۲۵۰-۳۷۵ گرم در متر مکعب	۹۷/۹/۲۱
۱۴۷	سه جدایه موتانت تریکودرما	-	۱۰ ^۸	WP	پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای	پوسیدگی زغالی	سویا	ندارد	۵ کیلوگرم در هکتار	۱۴۰۳/۳/۲۱
۱۴۸	دیتیانون	دلان	۵۰٪	SC	ب آ اس اف	لکه سیاه	سیب	۴۵ روز	۰/۷۵ در هزار	۱۴۰۲/۵/۳۰
۱۴۹	دیفنو کونازول + سایپرو کونازول	دیویدند استار	۳/۶۳٪	FS	سینجنتا	سیاهک آشکار	جو	-	۲۰۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	۸۹/۳/۱۰

۱۵۰	دیفنو کونازول + سایپرو کونازول	دیویدند استار	۳/۶۳%	FS	سینجنتا	سیاهک آشکار	گندم	-	۱۰۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	۸۹/۹/۱
۱۵۱	دیفنو کونازول + سیفلوفنامید	سیدلی تاپ	۱۴%	DC	سینجنتا	سفیدک پودری	خیار در شرایط گلخانه-ای	-	۱ در هزار (عدم کاربرد بیش از دو نوبت در طول یک فصل)	۹۷/۸/۱۴
۱۵۲	دیفنو کونازول ۱۲۵ گرم/لیتر + سیفلوفنامید ۱۵ گرم/لیتر	سیدلی تاپ	۱۴%	DC	سینجنتا	سوختگی استمفیومی برگ	سیب	۱۵ روز	۱۰۰۰ میلی لیتر در هکتار با فاصله ۷-۱۰ روز به صورت متناوب	۱۴۰۳/۴/۱۱
۱۵۳	دیفنو کونازول + فلوکسایپروکسادی (xemium)	داگونیس	۱۲/۵%	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	خیار گلخانه-ای	۳ روز	۰/۵ در هزار	۹۹/۱۰/۲۲
۱۵۴	دیفنو کونازول + فلوکسایپروکسادی (xemium)	داگونیس	۱۲/۵%	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	سیب	۳ روز	۰/۶ در هزار	۱۴۰۰/۹/۲۲
۱۵۵	دیفنو کونازول + فلوکسایپروکسادی (xemium)	داگونیس	۱۲/۵%	SC	ب آ اس اف	لکه سیاه سیب	سیب	-	۰/۶ در هزار	۱۴۰۰/۱۲/۹
۱۵۶	دیفنو کونازول + فلوکسایپروکسادی (xemium)	داگونیس	۱۲/۵%	SC	ب آ اس اف	لکه موجی	سیب زمینی	۷ روز	۷۵۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۷/۲۵
۱۵۷	دیفنو کونازول + فلوکسایپروکسادی (xemium)	داگونیس	۱۲/۵%	SC	ب آ اس اف	لکه موجی	گوجه فرنگی	۳ روز	۱۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۲/۳/۲۹
۱۵۸	دیفنو کونازول ۵۰ گرم/لیتر + فلوکسایپروکسادی ۷۵ گرم/لیتر (xemium)	داگونیس	۱۲/۵%	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	توت فرنگی		۰/۶ در هزار	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۱۵۹	دیفنو کونازول ۵۰ گرم/لیتر + فلوکسایپروکسادی ۷۵ گرم/لیتر	داگونیس	۱۲/۵%	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	گوجه فرنگی	۳ روز	۶۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۳/۴/۱۱
۱۶۰	دیمتومورف + پیراکلوستروبین	کابریو دو	۱۱/۲%	EC	ب آ اس اف	آلترناریا	گوجه فرنگی	۳ روز	۲ لیتر در هکتار	۹۴/۱۲/۱۰
۱۶۱	دیمتومورف + مانکوزب	آکروبات ام زد	۶۹%	WG	ب آ اس اف	سفیدک داخلی	سیب زمینی	۷ روز	۲ کیلوگرم در هکتار	۹۴/۸/۲۵

۱۶۲	سایپروکونازول + کاربندازیم	آلتو کمی	۴۲٪	SC	سینجنتا	پوسیدگی اسکلروتینیایی	ساقه کلزا	-	۱ لیتر در هکتار	۹۴/۳/۱۱
۱۶۳	سیازوفامید	رانمن	۴۰٪	SC	ایشیهارا	سفیدک داخلی	خیار- گلخانه	۳ روز	۰/۴-۰/۵ در هزار	۹۱/۳/۸
۱۶۴	سیازوفامید	رانمن	۴۰٪	SC	ایشیهارا	بازدگی	سیب زمینی	-	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	۹۴/۷/۶
۱۶۵	سیازوفامید	رانمن	۱۰٪	SC	ایشیهارا	سفیدک داخلی	خیار- گلخانه	۳ روز	۱/۵ در هزار	۹۶/۵/۲
۱۶۶	سیازوفامید	رگنانت	۲۰٪	SC	بازرگانان سرای سپند پارس شاندوگ هایلر	سفیدک داخلی	خیار(گلخانه)	-	۰/۶ در هزار(بیش از سه نوبت متوالی و بیش از شش نوبت در یک دوره تولید ممنوع است).	۹۷/۱۰/۱۷
۱۶۷	سولفور	سولفولاک	۸۰٪	WG	بیسترفیلد	سفیدک پودری	خیار	۱ روز	۳ کیلوگرم در هکتار	۹۲/۴/۱۷
۱۶۸	سولفور	گوگرد سمیران	۸۰٪	SC	سمیران	سفیدک پودری	انگور	-	۲/۵ در هزار	۹۲/۸/۲۷
۱۶۹	سولفور	سولفور ارکیده سازان	۴۰٪	SC	ارکیده سازان	سفیدک پودری	شلیل	۲۰ روز	۳/۷۵ در هزار	۹۳/۶/۱۰
۱۷۰	سوافور	پارومی دی	۸۰٪	DF	آریا شیمی کروماندل	سفیدک پودری	خیار گلخانه	-	۳ در هزار با مشاهده اولین علائم و در تناوب با سایر قارچ کش ها	۹۹/۳/۲۶

۱۷۱	سیپرودینیل	سیپرودین	۵۰٪	WG	آتیه نگین فلات Shaanxi hengrun chemical industry	پوسیدگی خاکستری	انگور	۱۴ روز	۱ در هزار	۱۴۰۱/۱۱/۳
۱۷۲	سیپرودینیل+فلودیوکسانیل	سویچ	۶۲/۵٪	WG	سینجنتا	نکروز ساقه	گوچه فرنگی	۳ روز	۱ در هزار	۱۴۰۲/۵/۹
۱۷۳	سیپرودینیل+فلودیوکسانیل	سویچ	۶۲/۵٪	WG	سینجنتا	کپک خاکستری	توت فرنگی	۳ روز	۰/۸ در هزار	۱۴۰۲/۵/۹
۱۷۴	سیپرودینیل ۳۷.۵٪+فلودیوکسانیل ۲۵٪	سویچ	۶۲/۵٪	WG	سینجنتا	کپک خاکستری	خیار	۷ روز	۱ در هزار	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۱۷۵	سولفات مس ۱۰۲+ فسفیت پتاسیم ۵۱۹	سراکوئینت	۶۲/۲٪	SP	رهروان رویش سبز	کپک خاکستری	توت فرنگی	–	۳ در هزار	۹۸/۱۰/۹
۱۷۶	فاموکسادون+ سیموکسانیل	اکولایزر	۵۲/۵٪	WG	خزر سم کود Zhejiang Sega	سفیدک داخلی	پیاز	–	۰/۴ کیلوگرم در هکتار (مزرعه)	۹۷/۱۲/۱۳
۱۷۷	فاموکسادون+ سیموکسانیل	زرین پرو	۵۲/۵٪	WG	زرین خوشه جنوب Shanghai Shengnong	سفیدک کرکی	سیب زمینی	۱۴ روز	۴۰۰ گرم در هکتار	۹۹/۶/۲۴
۱۷۸	فلوتیانیل	گاتن	۵٪	EC	الیت ساوان OAT AGRO	سفیدک پودی	انگور	۱۴ روز	۰/۲۵ در هزار	۹۹/۴/۹

۱۷۹	فناما کریل	لیانگدی	۲۵٪	SC	کیمیا سبزینہ پویا جیانگ سو	فوزاریوم	سنبلہ گندم	–	۳ لیتر در هکتار (در تناوب با قارچ کش های رایج)	۹۷/۱۰/۱۷
۱۸۰	فلو دیکسانیل	سلسنت	۱۰٪	FS	سینجنتا	شانکر ریزوکتونایی <i>Rhizoctonia solani</i>	سیب زمینی		۲۵۰ میلی لیتر به ازای ۱۰۰۰ کیلوگرم غده بذری	۱۴۰۱/۵/۱۰
۱۸۱	فلو کسایپروکساد	سرکادیس	۳۰٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	هلو	۲۱ روز	۰/۱۵ در هزار	۱۴۰۰/۴/۲۸
۱۸۲	فلو کسایپروکساد	سرکادیس	۳۰٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	انگور	۲۱ روز	۰/۱۵ در هزار	۱۴۰۰/۹/۱
۱۸۳	فوزتیل آلومینیوم	الیت	۸۰٪	WG	شاندونگ داچنگ	گموز	پسته	۳۰ روز	۲/۵ در هزار	۹۲/۱۲/۵
۱۸۴	فوزتیل آلومینیوم	رودر	۸۰٪	WP	دوگال	گموز	مرکبات	۱۴ روز	۲ در هزار	۹۶/۵/۲
۱۸۵	فوزتیل آلومینیوم	فیتوکیور	۸۰٪	WP	گل سم گرگان LiminChemical	انگومک	پسته	۱۴ روز	۲/۵ در هزار	۹۹/۱۰/۲۲
۱۸۶	فوزتیل آلومینیوم + فلوپیکولید	پروفایلر	۷۱/۱٪	WG	بایر آگ	سفیدک داخلی	انگور	۷ روز	۲-۲/۵ در هزار بسته به شدت بیماری در سه نوبت	۹۵/۸/۲۴
۱۸۷	عصاره گیاه اسپند ۱۳٪ (هارمین)	نانوپگان			نانوامولسیون	پوسیدگی فوزاریومی ریشه و ساقه	گوچه فرنگی		۱۵ در هزار	۱۴۰۳/۷/۱۶

۱۸۸	کروز کسیم متیل	استروبی	۵۰٪	WG	ب آ اس اف	سفیدک پودری	کدوئیان	۴ روز	۰/۲ در هزار	۸۷/۵/۲
۱۸۹	کینوسول (سولفات ۸- هیدروکسی کینولین)	بلتانول	۳۷/۵٪	SL	سبا کوشا کشت پروبلت فیتو اسپانیا	بوته میری Phytophthora melonis	خیار (گلخانه و فضای باز)	-	۰/۵ در هزار (نوبت اول بلافاصله پس از کاشت و نوبت دوم بین مرحله ۲-۳ برگی همراه با آب آبیاری)	۹۸/۴/۱۰
۱۹۰	ماندی پروپامید+ دیفنوکونازول	کاریال استار	۵۰٪	SC	سینجنتا	سفیدک داخلی	خیار(گلخانه)	۱ روز	۰/۷ در هزار (استفاده بیش از دو نوبت متوالی و بیش از ۴ نوبت در یک دوره تولید ممنوع است.	۹۷/۱۰/۱۷
۱۹۱	ماندی پروپامید+ دیفنوکونازول	کاریال استار	۵۰٪	SC	سینجنتا	لکه موجی- سفیدک داخلی	گوچه فرنگی	۳ روز	۷۰۰ میلی لیتر در هکتار در مناطق مرطوب کناره های دریای خزر و سواحل خلیج فارس	۱۴۰۲/۳/۲۹
۱۹۲	مایکلوبوتانیل	آتیس	۴۰٪	WP	سبزمحصول داتیس ناگارجونا اگری کم	لکه سیاه	سیب درختی	-	۰/۳ در هزار (به صورت تناوبی با قارچ-کش های دیگر)	۹۷/۹/۲۶
۱۹۳	متا بی سولفیت سدیم	سولفور پد	۷ گرم متا بی سولفیت	پد کاغذی	اروم زرین خوشه	بیماریهای قارچی	انگور	-	یک بسته ۷ گرمی برای نگهداری ۵ کیلوگرم انگور	۸۶/۸/۲۸
۱۹۴	متالاکسیل + مانکوزب	داونی جی	۷۲٪	WP	گیاه	بوته میری در مزرعه و گلخانه	خیار	۷ روز	۲ در هزار در مزرعه به صورت محلول ریزی پای بوته و در گلخانه به منظور ضد عفونی خاک جهت کنترل عامل بیماری فوق به مقدار ۲۰۰ گرم در هر متر مکعب خاک به صورت مخلوط با خاک	۹۶/۴/۱۹

۹۳/۲/۱۵	۲ در هزار در مزرعه به صورت محلول ریزی پای بوته و در گلخانه به منظور ضد عفونی خاک جهت کنترل عامل بیماری فوق به مقدار ۲۰۰ گرم در هر متر مکعب خاک به صورت مخلوط با خاک	۷ روز	خیار	بوته میری در مزرعه و گلخانه	بهاور شیمی	WP	۷۲٪	رزالاکسیل	متالاکسیل + مانکوزب	۱۹۵
۹۴/۷/۶	۳ کیلوگرم در هکتار	۷ روز	سیب زمینی	سفیدک داخلی	بهاور شیمی	WP	۷۲٪	رزالاکسیل	متالاکسیل + مانکوزب	۱۹۶
۹۹/۳/۱۲	۲/۵ کیلوگرم در هکتار	-	سیب زمینی	سفیدک داخلی	کیمیا گوهر خاک Leeds	WP	۷۲٪	منکوماکسیل	متالاکسیل ۸ درصد + مانکوزب ۶۴ درصد	۱۹۷
۹۹/۹/۱۷	۲ در هزار	-	خیار گلخانه	بوته میری	ایرمان UPL	WP	۷۲٪	منکولاکسیل	متالاکسیل ۸ درصد + مانکوزب ۶۴ درصد	۱۹۸
۹۹/۴/۹	۲/۵ در هزار	-	گوجه فرنگی	سفیدک داخلی	پیراکشت شیمی Industrias Quimicas Valles	SC	۲۲٪	آر متیل آر	متالاکسیل ۳/۵ درصد + هیدروکسید مس ۱۸/۵ درصد	۱۹۹

۲۰۰	متالاکسیل ام (مفنوکسام) ۱۰ گرم/لیتر+فلودیوکسانیل ۲۵ گرم/لیتر	ماکسیم ایکس ال	۳/۵٪	FS	سینجنتا	فوزاریوم	ذرت	۱ در هزار	۱۴۰۰/۶/۱
۲۰۱	متالاکسیل	ریدومکس	۵٪	GR	اکسیر کشاورزی یزد Zhejiang Heben	بوته میری	خیار	۲ در هزار	۹۹/۹/۱۷
۲۰۲	متالاکسیل	ردوکسیل	۵٪	GR	گیاه Zhejiang Heben	بوته میری	خیار	۲ در هزار	۹۹/۹/۱۷
۲۰۳	متالاکسیل	ردوکسیل	۵٪	GR	گیاه	بوته میری <i>Pythium aphanidermatum</i>	خیار	۲ گرم در متر مربع (گلخانه) به صورت گرانول پاشی	۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۲۰۴	مفنوکسام ۱۲/۴٪+آزوکسی استروبین ۳۲/۲٪	یونیفورم	۴۴/۶٪	SE	سینجنتا	بوته میری	خیار(گلخانه و فضای باز)	۱/۵ لیتر در هزار	۹۸/۴/۱۰
۲۰۵	متالاکسیل ام ۱۰ گرم/لیتر+فلودیوکسانیل ۲۵ گرم/لیتر	مالوین ایکس ال اف اس ۰۳۵	۳/۵٪	SC	گیاه پرنیان اطلس Safa Tarim	پوسیدگی فوزاریومی ریشه	پیاز	۳/۵ لیتر در هکتار در مناطق با آلودگی زیاد	۱۴۰۱/۹/۱
								۲/۵ لیتر در هکتار در مناطق با آلودگی کم	
۲۰۶	مفن تری فلوکونازول	رویونا	۷/۵٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	انگور	یک در هزار	۱۴۰۲/۵/۳۰

۲۰۷	نمک های مونو و دی پتاسیم اسید فسفونیک	فسفایت	۵۳٪	SL	JI Biotech	سفیدک داخلی	خیار- گلخانه	صفر روز	۳-۴ در هزار	۹۵/۶/۲۹
۲۰۸	نمک های مونو و دی پتاسیم اسید فسفونیک	اگریفوس	۶۰٪	SL	بصیر شیمی Agrichem	پوسیدگی فایتوفترایی ریشه و طوقه	پسته	-	۲/۵ در هزار	۱۴۰۰/۹/۲۹
۲۰۹	های مکسازول	تاچی گارن	۳۰٪	SL	Mitsui	پژمردگی فوزاریمی	گوچه فرنگی	۱۰ روز	قبل از انتقال نشاء یک در هزار، یک هفته بعد از انتقال نشاء دو در هزار و دو هفته پس از سمپاشی دوم به مقدار ۲ در هزار	۹۵/۱۰/۲۷
۲۱۰	هیدروکسید مس + اکسی کلرور مس	BADGE	۲۸٪	WG	بازارگان کالا ISAGRO	پیچیدگی برگ	هلو	-	۱/۲ در هزار	۱۴۰۰/۹/۱۵
۲۱۱	هیدروکسید مس + اکسی کلرور مس	BADGE	۲۸٪	WG	بازارگان کالا ISAGRO	سفیدک کرکی	گوچه فرنگی	سه روز	۲/۵ کیلوگرم در هکتار	۱۴۰۱/۵/۱۰
۲۱۲	عصاره سیر ، روغن پنبه دانه، روغن ذرت	میلدی کیور	۸۳٪	SL	بازرگان کالا Jh biotech	سفیدک پودری	خیار	-	مزرعه: ۱۰ در هزار گلخانه: ۷/۵ در هزار	۹۶/۸/۲۹
۲۱۳	اسانس روغن بنه	روماک	۶۰٪	EC	روماک گستر غرب	کپک خاکستری	توت فرنگی	ندارد	۴ در هزار	۹۸/۱۰/۹